

【考点1】中医外科学的发病机理：邪正盛衰、气血凝滞、经络阻塞、脏腑失和。

【考点2】辨脓的方法：**接触法、透光波、点压另**、B超。

【考点3】辨痛：**湿痛一痛而酸胀，肢体沉重**，按之出现可凹水肿或见糜烂流滋（月廉疮、股肿）；**痰痛一疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛**（脂瘤、肉瘤）。

【考点4】油膏：**金黄膏、玉露膏**适用于疮疡**阳证**；**冲和膏**有活血止痛、疏风祛寒、消肿软坚的作用，适用于**半阴半阳证**；**回阳玉龙膏**有温经散寒、活血化瘀的作用，适用于**阴证**。

【考点5】膏药：太乙膏、千捶膏用于红肿热痛明显之阳证疮疡；阳和解凝膏温经和阳、祛风散寒、调气活血、化痰通络，用于阴证疮疡未溃者；咬头膏，适用于肿疡脓成不能自破，以及患者不愿接受手术切开排脓者。

【考点6】中医外科内治法中，温经通阳法的代表方是**阳和汤**。温经散寒的代表方是**独活寄生汤**。祛痰法：疏风化痰法一牛黄解毒汤合二陈汤；清热化痰法一清咽利膈汤合二母散。

【考点7】箍围药：**阳证**多用菊花汁、银花露或冷茶汁调，**半阴半阳证**多用葱、姜、韭捣汁或用蜂蜜调，**阴证**多用醋、酒调。

【考点8】**提脓去腐药**（升丹）九一丹、八二丹、七三丹、五五丹、九黄丹、**黑虎丹（不含升丹）**。

【考点9】**切丑法**适应症：一切外疡，确已成脓者。**垂镰法**适应症：急性阳证疮疡。挑治法，适用于内痔出血、肛裂、脱肛、肛门瘙痒、颈部多发性脓肿等垫棉法，适用于溃疡脓出不畅有袋脓者；或疮孔窦道形成脓水不易排尽者；或溃疡脓腐已尽，新肉已生，但皮肉一时不能黏合者。注意：在急性炎症红肿热痛尚未消退时不可应用

【考点10】**挂线法**适应症：疮疡溃后，脓水不净，虽经内服、外敷等治疗无效而形成漏管或窦道者；或疮口过深，或生于血络丛集处，而不宜采用切开手术者。

【考点11】切口选择：以便于引流为原则，选择脓腔最低点或最薄弱处进刀；一般疮疡宜循经直切；乳房部应以乳头为中心放射状切开，免伤乳络；面部脓肿应尽量沿皮肤的自然纹理切开；手指脓肿应从侧方切开；关节区附近的脓肿切口尽量避免越过关节；若为关节区脓肿，一般施行横切口、弧形切口或形切口；肛旁低位脓肿应以肛管为中心做放射状切开。

【考点12】疖 肿势局限，范围多在3cm左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。分类：有头市：突起根浅，中心有一脓头，出脓即愈；无头市一无脓头；蝼蛄市一多发于儿童头部；市病：好发于项后发际、背部、臀部，患消渴病、习惯性便秘或营养不良者易患本病。

【考点13】市：体虚毒恋，阴虚内热（仙方活命饮合增液汤加减）；体虚毒恋，脾胃虚弱，治应健脾和胃，清化湿热（五神汤合参苓白术散加减）。

【考点14】手足部疔疮容易损伤筋骨，颜面部疔疮多发生走黄；蛇眼疔：局限于指甲一侧边缘近端处，宜**沿甲旁0.2cm**挑开引流；蛇头疔：中期手指末端呈舌头状肿胀，宜在**指掌面一侧**，做纵行切口，必要时可对口引流；蛇肚疔发于指腹部，宜在**手指侧面做纵行切口**，切口长度不宜超过上下指关节面；托盘疔宜依**掌横纹切开**，切口应够大，保持引流通畅。

【考点15】红丝疔：红丝细一 一刀针沿红丝行走途径，寸寸挑断，令微出血。 _____

【考点16】**痈**的特点：光软无头，红肿疼痛，结块范围多6~9cm,发病迅速，易肿易脓、易溃

易敛。

【考点 17】颈痈：风热痰毒证：治法应散风清热，化痰消肿（牛蒡解肌汤或银翘散加减）。

【考点 18】发：其特点是初起无头、红肿蔓延成片，中央明显，四周较淡，边界不清，灼热疼痛。生于结喉处一锁喉痈；生于臀部一臀痈；生于手背一手发背；生于足背一足发背。

【考点 19】有头疽的特点：①初起有粟粒样脓头②溃烂后状如莲蓬、蜂窝，范围常超过 9~12cm，③好发于项后、背部④多见于中老年人及消渴病患者，并容易发生内陷。

【考点 20】疔疮走黄的原因：早期失治；挤压碰伤，过早切开；误食辛热之品及酒肉鱼腥等发物；艾灸疮头。

【考点 21】内陷的分类：火陷-有头疽 1-2 候毒盛期，**壬陷**-有头疽 2-3 候溃脓期，**虚陷**-有头疽 4 候收口期。走黄的发生主要在于火毒炽盛，毒入营血，内攻脏腑。内陷证发生的根本原因，在于正气内虚，火毒炽盛，加之失治或不当，以致正不胜邪，反陷入里，客于营血，内犯脏腑。

【考点 22】男子乳头属肝，乳房属肾；女子乳头属肝，乳房属胃。

1 考点 23】乳痈：病因病机：乳汁郁积（最常见原因）；**肝郁胃热；感受外邪。**

【考点 24】乳痈：气滞热壅证，治法疏肝清胃，通乳消肿，用**瓜蒌牛蒡汤**。脓肿形成时，应在波动感及压痛最明显处及时切开排脓。切口应按乳络方向并与脓腔基底大小一致，切口位置应选择脓肿稍低的部位。

【考点 25】乳癖 乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关，好发于 25~45 岁的中青年女性，相当于西医的乳腺增生病；乳核：好发于 20~25 岁青年妇女，乳中结核，形如丸卵，边界较清楚，表面较光滑，推之可活动，相当于西医的乳腺纤维腺瘤；乳岩晚期，乳房肿块溃烂，疮口边缘不整齐，中央凹陷似岩穴，有时外翻似菜花，可渗出紫红色血水，恶臭难闻。

【考点 26】气瘰（甲状腺呈弥漫性肿大，腺体表面较平坦，质软不痛，皮色如常，腺体随吞咽动作而上下移动）用四海舒郁丸治疗，肉瘰用**海藻玉壶汤加减**治疗 C

【考点 27】**脂瘤**（粉瘤）：皮肤间出现圆形质软的肿块，中央有粗大毛孔，可挤出有臭味的粉渣样物。

【考点 28】**瘦瘤**（结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓。相当于西医的急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎）：气滞痰凝证，治法疏肝清胃，通乳消肿，用牛蒡解肌汤。

【考点 29】**疣**分类：发于手背、手指、头皮等处称为千日疮、疣目、枯筋箭、痕子，发于颜面、手背、前臂等处称为扁瘡，发于胸背部有脐窝的赘疣称为鼠乳，发于足跖部是跖疣，发于颈周围及眼睑部位，呈细软丝状突起是丝状疣、线痕。

【考点 30】**白秃疮**（白癣）皮损特征：在头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片。

【考点 31】肥疮（黄癣）皮损特征：有黄癣痂堆积，癣痂呈蜡黄色，肥厚，富黏性，边缘翘起，中心微凹，上有毛发贯穿，质脆易粉碎，有特殊的鼠尿臭。是头癣最常见的一种，

【考点 32】疥疮特点：夜间剧痒，在皮损处有灰白色、浅黑色或普通皮色的隧道，可找到疥虫。以外治杀虫止痒为主。硫磺是特效药。

【考点 33】治疗失荣早期气郁痰结证，应首选化痰开郁方。

【考点 34】白屑风中风热血燥证的代表方是，消风散合当归饮子。

【考点 35】接触性皮炎湿热毒蕴证一为清热祛湿，凉血解毒-龙胆泻肝汤合化斑解毒汤。

【考点 36】淋病：湿热毒蕴证一立胆泻肝汤加土茯苓、草薢、红藤等；阴虚毒恋证一1 柏地黄丸加土茯苓、草薢等。

【考点 37】一期梅毒主要表现为疮疮（硬下疳），二期梅毒主要表现为杨梅疮，三期梅毒主要表现为杨梅瘡」常侵犯多个脏器。

【考点 38】尖锐湿疣湿毒下注证，当利湿化浊，清热解毒，用草薢化毒汤加黄柏、土茯苓、大青吐。

【考点 39】蛇串疮：皮肤上出现成簇水疱，呈带状分布，痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。肝经郁热证宜胆泻肝汤。

【考点 40】湿疹：西医的湿疹。特点：对称分布，多形性损害，剧烈瘙痒，反复发作，易成慢性。湿热蕴肤证-龙胆泻肝汤合草薢渗湿汤加減；血虚风燥证一当归饮子或四物消风饮加減。

【考点 41】内痔好发于膀胱截石位 3、7、11 点处；混合痔多发于膀胱截石位 3、7、11 点处，以 11 点处最为多 J O

【考点 42】内痔分期：I 期仅排便时带血、滴血，量少，无疼痛及脱出。II 期用力时有痔块脱出，但能自行回纳。III 期便时痔核经常脱出肛外，不能自行回纳，须用手托、平卧休息或热敷后方可还纳。IV 期平时腹压稍大时痔核即脱出肛外，借助外力亦常不能回纳，易感染，形成水肿、糜烂和坏死，疼痛剧烈。

【考点 43】内痔：内治法：风伤肠络一凉血地黄汤加減；湿热下注一脏连丸加減；气滞血瘀一止痛如神汤加減；脾虚气陷一补中益气汤加減。

【考点 44】肛隐窝炎并发症：肛乳头炎、肛乳头肥 7 o

【考点 45】肛痛分类：肛门旁皮下脓肿；坐骨直肠间隙脓肿；骨盆直肠间隙脓肿；直肠后间隙脓肿。

【考点 46】肛痛火毒炽盛证-透脓散，热毒蕴结证-仙方活命饮、黄连解毒汤加減，阴虚毒恋证一青蒿鳖甲汤合三妙丸加減。

【考点 47】脱肛分类：一度脱垂：直肠黏膜脱出，长 3~图，三易出血，便后可自行回纳。二度脱垂：直肠全层脱出，脱出物长 5~10cm，便后有时需用手回复。三度脱垂：直肠及部分乙状结肠脱出，长达 10cm 以上，肛门松弛无力。

【考点 48】肛漏：单纯性肛漏肛门旁皮肤仅一个外口，且管道直通肛隐窝之内。

【考点 49】复杂性肛漏指在肛门内、外有三个以上开口，或管道穿通两个以上间隙，或管道多而支管横生，或管道绕肛门而生，呈马蹄形肛漏。

【考点 50】扩肛法适用于早期的肛裂，无结缔组织外痔、肛乳头肥大等合并症者。

【考点 51】切开疗法适用于陈旧性肛裂，伴有结缔组织外痔、肛乳头肥大等。

【考点 52】肛裂侧切术适用于不伴有结缔组织外痔、皮下痿等的陈旧性肛裂。

【考点 53】纵切横缝法适用于陈旧性肛裂伴有肛管狭窄者。

【考点 54】**锁肛痔**，发生在肛管直肠的恶性肿瘤，便血；排便习惯改变；大便变形；转移征象。便血是直肠癌最常见的早期症状。直肠指检是诊断直肠癌最重要的方法。

【考点 55】急性子痛：主张早期应用**抗生素**，在药敏试验未获结果前，可选用抗菌谱较广的抗生素。湿热下注一**枸橘汤**或**龙胆泻肝汤**加減；气滞痰凝一**橘核丸**加減。

【考点 56】子痰在中医药辨证论治的同时，应用西**药抗结核治疗** 6 个月以上。

【考点 57】阴茎痰核外治法：可以外敷**阳和解凝膏**或**黑退弟**。

【考点 58】精浊：尿频、尿急、尿痛、尿道内灼热不适或排尿不净之感；

精浊：湿热蕴结证一**八正散**或**龙胆泻肝汤**加減；

气滞血瘀证一**前列腺汤**加減；

阴虚火旺证一**知柏地黄汤**加減；

肾阳虚损证一**济生肾气丸**加減。

【考点 59】精瘰 多见于 50 岁以上的中老年男性，逐渐出现进行性尿频，夜间明显，并伴排尿困难，尿线变细。湿热下注证，治法清热利湿，消癰通闭一**八正散**加減；气滞血瘀证一**沉香散**。

【考点 60】尿道结石主要表现为**排尿困难**、**排尿费力**，呈**点滴状**，或出现尿流中断及急性尿潴留。

【考点 61】股肿（肢体肿胀、疼痛、局部皮温升高和浅静脉怒张四大症状，好发于下肢髂股静脉和股腘静脉，可并发肺栓塞和肺梗塞）气虚湿阻一益气健脾，祛湿通络一**四妙勇安汤**。

【考点 62】青蛇毒多见于**筋瘤后藤**，四肢多见。

湿热瘀阻证一清热利湿，解毒通络一**二妙散**合**茵陈赤豆汤**加減；

肝郁蕴结证一疏肝解郁，活血解毒一**柴胡清肝汤**或**复原活血汤**。

【考点 63】月廉疮湿热下注证，清热利湿，和营解毒一**二妙丸**合**五神汤**加減；

气虚血瘀证，益气活血，祛瘀生新一**补阳还五汤**合**四妙汤**加減。

【考点 64】脱疽的发病以**脾肾亏虚**为本，**寒湿外伤**为标，气血凝滞、经脉阻塞为主要病机。**一期（局部缺血期）**：患肢末端发凉，怕冷，麻木，酸痛，间歇性跛行；**二期（营养障碍期）**：患肢发凉，怕冷，麻木，坠胀疼痛，间歇性跛行加重，并出现静息痛；**三期（坏死期或坏疽期）**：坏疽可先为一趾或数趾，逐渐向上发展，合并感染时，足趾紫红肿胀、溃烂坏死，呈湿性坏疽，或足趾发黑，干瘪，呈干性坏疽。

【考点 65】成人头、面、颈部为**丝**；双上肢为 **2x9%**；躯干前后包括外阴部为 **3x9%**；双下肢包括臀部为 **5x9%+1%=46%**。

【考点 66】破伤风发作期的典型发作其肌肉强直性痉挛首选从**头面部**开始。

【考点 67】《傅青主女科》该书立论着眼于**干脾肾**三脏，治疗侧重**干培养气血、调理脾肾**。

【考点 68】《经效产宝》是我国现存**的第二 1** 产科专著。

【考点 69】《邯郸遗稿》明**代赵献可**著；重视脾肾，提倡**金门**学说。

【考点 70】子门，又称子户，指子宫颈口，排出月经和娩出胎儿的关口。

【考点 71】产褥期（6~8 周）生理特点：多虚多瘀。红恶露（血性恶露）持续时间：3~4 天。

【考点 72】望恶露：恶露量多，色紫红，有块，腹痛拒按 T 血瘀。色红有臭气 T 血热

【考点 73】宫腔注入：宫腔及输卵管粘连阻塞造成的月经不调、痛经、不孕症。

【考点 74】直肠导入：盆腔瘀*搭积、慢性盆腔炎、盆腔瘀血综合征、产后发热、产后便秘。

【考点 75】“并月”（两个月来潮一次）；“居经”或“季经”（三个月一潮）；“避年”（一年一行）；“暗经”（终生不潮而却能受孕）；“激经”（受孕初期仍能按月经周期有少量出血）。

【考点 76】女性生殖轴：肾-天癸-冲任-胞宫生殖车”

【考点 77】妊娠生理现象：月经停闭，脉滑，妊娠反应，子宫增大，乳房变化，下腹膨隆。

【考点 78】中医妇科治法中，滋肾益阴的代表方剂是左归丸。

【考点 79】月经后期血寒证的实寒证，当温经散寒调经，用温经汤（《妇人大全良方》），虚寒证当扶阳祛寒调经，用温经汤（《金匱要略》）。两者鉴别要点在于小腹是喜按还是拒按，喜按为虚证，拒按为实证。

【考点 80】月经先后无定期肾虚证一经血色暗淡、质稀腰酸酸痛一当补肾调经，用固阴煎。

【考点 81】月经过少血虚证一经血色淡、质稀，小腹空坠，头晕眼花-滋血汤或小营煎。

【考点 82】崩漏急症处理：补气摄血，温阳，滋阴固气，祛瘀，针灸，西药或手术止血。

【考点 83】崩漏的治疗原则：急则治标，缓则治本。

【考点 84】治崩三法：塞流，澄源，复旧。

【考点 85】闭经寒凝血瘀证一小腹冷痛按，得热痛减，形寒肢冷一温经汤（《妇人大全良方》）

【考点 86】肾气亏损痛经：经行小腹隐痛一量少、色暗淡、质稀一益肾调经汤或调肝汤。

【考点 87】经行感冒风寒证一发热，恶寒，无汗，鼻塞流涕，咽喉痒痛，脉浮紧-荆穗四物汤。

【考点 88】经行发热瘀热壅阻证一经色紫暗，夹有血块-血府逐瘀汤加丹皮。

【考点 89】经行情志异常肝经郁热证一烦躁易怒，或抑郁不乐，头晕目眩-丹栀逍遥散。

【考点 90】绝经前后诸证心肾不交证一心烦失眠，心悸易惊，腰酸乏力-天王补心丹。

【考点 91】女子年逾 16 周岁，月经尚未来潮，为原发性闭经，或月经周期已建立后又中断 6 个月以上者称继发性闭经。

【考点 92】崩漏是指经血非时暴下不止或淋漓不尽，前者谓之崩中，后者谓之漏下。

【考点 93】经行吐衄（又称“倒经”、“逆经”）。

肝经郁火证一清肝调经一清肝引经汤；肺肾阴虚证一滋阴养肺一顺经汤或加味麦门冬汤。

【考点 94】月经病的三条治疗原则是重在治本调经，分清先病和后病，急则治标，缓则治本。

【考点 95】月经病近规 f1 是：顺应月经周期中阴阳气血的变化规律；二长顺应不同年龄 阶段论

治的规律；三是掌握虚实补泻规律 C

【考点 96】月经先期阴虚血热证一色红、质稠，两额潮红，手足心热，咽干口燥一西地汤。

月经先期阳盛血热证一量多、色深、质稠心烦，面红口干一清经散。

【考点 97】带下过多肾阳虚证-腰酸如折，畏寒肢冷，小腹有冷感一内补丸。

【考点 98】带下过少血枯瘀阻证-经色紫暗，有血块，肌肤甲错-小营煎加丹参、桃仁、牛膝。

【考点 99】凡峻下、滑利、 ㄱ 盐 L 定血、耗气、散气及一切有毒药品，都应慎用或禁用。

【考点 100】妊娠恶阻脾胃虚弱证-健脾和胃，降逆止呕-香砂六君子汤。o

【考点 101】胎漏、胎动不安血瘀证-口淡，呕吐清涎，头是体倦一桂枝茯苓丸合寿胎丸。

【考点 102】堕胎、小产：凡妊娠 12 周内胚胎自然殒堕者称“堕胎”，妊娠 12-28 周内胎儿已成形而自然殒堕者称“小产”或“半产”。

【考点 103】滑胎：凡堕胎或小产连续发生 3 次或 3 次以上者，称为“滑胎”，亦称“数堕胎”“屡孕屡堕”。

【考点 104】子肿脾虚证-面色黄白无华，神疲气短懒言，口淡而腻一自述散加砂仁或健脾利水汤。

【考点 105】三痞：病痞，病郁冒，大便难。三急：呕吐、盗汗、泄泻。三逆：冲心，冲胃，冲肺。三审：小腹痛与不痛，大便通与不通，乳汁的行与不行。

【考点 106】子气 T 自膝至足肿，小水长者；皱脚 T 两脚肿而肤厚者；脆脚 T 两脚肿而皮薄者 c

【考点 107】子病又称子冒。妊娠病证；其主症是妊娠晚期或临产前及新产后，突然发生眩晕倒仆，昏不知人，两目上视，牙关紧闭，四肢抽搐，全身强直，须臾醒，醒复发，甚至昏迷不醒者。

【考点 108】产后身痛治疗原则：以外上虚化瘀，调畅气血”为主。

【考点 109】儿枕痼是指由血瘀引起的产后腹痛。

【考点 110】妇科杂病最常见的病因病机是气滞血瘀，湿热瘀结，痰湿壅阻。

【考点 111】癥瘕气滞血瘀证-行气活血，化瘀消癥一香棱丸或大黄蜃虫丸。鉴别要点：精神抑郁，胸闷不舒。

【考点 112】不孕症肾气虚证-色暗，头晕耳鸣，腰膝酸软，精神疲倦-毓麟珠。

【考点 113】不孕症痰湿内阻证 T 多青春期开始形体肥胖，头晕心悸，胸闷泛恶 T 苍附导痰丸。

【考点 114】急性盆腔炎湿热瘀结证用仙方活命饮，慢性盆腔炎湿热瘀结证用银甲丸或当归芍药散。鉴别要点：急性下腹部疼痛拒按或胀满，热势起伏，寒热往来。慢性少腹部隐痛或疼痛拒按，痛连腰骶，低热起伏。

【考点 115】癥：有形可征，固定不移，痛有定处；属血病。

_____：假聚成形，聚散无常，推之可移，痛无定处；属气病。

【考点 116】女子婚后未避孕，有正常性生活，同居 1 年，而未受孕者古称“全不产”；或曾有 过妊娠，而后未避孕，又连续 1 年未再受孕者，称“不孕症”古称“断绪 J

【考点 117】阴挺分度

恒 轻型：宫颈外口距处女膜缘<4cm,未达处女膜缘。

重型：宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈。

11 屢 轻型：宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内。

重型：部分宫体脱出阴道口。

坦度 宫颈与宫体全部脱出阴道口外。

【考点 118】人工流产并发症：人流综合征、子宫穿孔、人流不全、宫颈或宫颈管内口粘连、人流术后感染。

【考点 119】子宫内膜的周期性变化

① **增生期**：月经周期的 5~14 日，分早、中、晚三期。

② **分泌期**：月经周期的 15~28 日，分早、中、晚三期。

③ **月经期**：月经的 1~4 日。

【考点 120】诊断性刮宫的适应症：

① 子宫异常出血，需证实或排除子宫内膜癌、宫颈癌者。

② 月经失调需了解子宫内膜变化及其对性激素反应者。

③ 不孕症，了解有无排卵。

④ 疑有子宫内膜结核者。

⑤ 因宫腔残留组织或子宫内膜脱落不完全导致长时间多量出血者。

【考点 121】年龄分期的标准及临床意义

胎儿期受孕 t **出生**「**新生儿期**出生后**脐带结扎-出生后 28 天**。

婴儿期**出生后-1 周岁 c**

幼儿期**1 周岁-3 周岁°**

学龄前期**3 周岁四入小学前**(6~7 岁)。

学龄期**6~7 岁-青春期来临**(女 12 岁，男 13 岁)。

青春期女孩**11~12 岁—17~18 岁**，**男孩****3~14 岁—18~20 2**。

【考点 122】体重测量方法、正常值及临床意义

<6 个月出生时体重(kg)=3+0.7x 月龄

7~12 个月体重(kg)=6+0.25x 月龄

2 岁以上体重(kg)=8+2x 年龄

【考点 123】临床可用以下公式估算 2 岁后至 12 岁儿童的身高：身高(cm)=75+7x 年龄****

【考点 124】前囟出生时约 1.5~2cm,至 12~18 个月闭合。

【考点 125】出生时头围-33~34cm,出生后前 3 个月和后 9 个月各增长 6cm,1 周岁时 —46cm,2 周岁—48cm,5 周岁时—>50cm,15 岁时—14~15.5cm。

【考点 126】新生儿胸围-32cm,1 岁时-44cm;2 岁后胸围渐大于头围,其差数 (cm) 约等于其岁数减 1。

【考点 127】2 岁以内: 乳牙数=月龄-4 (或 6)。

【考点 128】血压:收缩压 (mmHg) = 30+2x 年 2,舒张压 (mmHg) 二收缩压 x2/3。

【考点 129】小儿动作发育顺序是由上向下、由粗到细、由不协调到协调进展的。

【考点 130】二抬四撑六会坐,七滚八爬周会走。

【考点 131】小儿生理特点: 脏腑娇嫩,形气未充 (“肺常不足” “脾常不足” “肾常虚”), 生机蓬勃,发育迅速 (“纯阳”学说)。

【考点 (32)】病理特点及临床意义: 发病容易,传变迅速,脏气清灵,易趋康复。

【考点 133】察二便:初生婴儿的胎粪, 呈暗绿色或赤褐色,黏稠无臭;母乳喂养儿,大便呈卵黄色,稠而不成形,常发酸臭气;牛奶、羊奶喂养儿,大便呈淡黄白色,质地较硬,有臭气。

【考点 134】方药剂量的计算:

新生儿一成人量的 1/3;乳婴儿一 1/3 (=2/6); 幼儿-1/2 (=3/6); 学龄前儿童一2/3; 学龄期儿童接近成人。

【考点 135】新生儿的特殊生理现象 新生儿两侧颊部各有一个脂肪垫隆起,称为“螳螂子”,有助吮乳,不能挑割。

新生儿上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米大小隆起颗粒,称为“马牙”,会于数周或数月自行消失,不需挑刮。

女婴生后 3~5 天乳房隆起如蚕豆到鸽蛋大小,可在 2~3 周后消退,不应处理或挤压。女婴生后 5~7 天,阴道有少量流血,持续 1~3 天自止者,是为假月经,一般不必处理。

【考点 136】小儿 4~6 个月起应逐渐添加辅食,12 个月左右可断乳。

【考点 (37)】添加辅食的原则: 由少到多,由稀到稠,由细到粗,由一种到多种。

【考点 138】胎怯辨证论治:①肾精薄弱证一哭声低微,肌肤不温,指甲软短,骨弱肢柔一益精充髓,补肾温阳-补肾地黄丸;②脾肾两虚证一啼哭无力,多卧少动,皮肤干皱一健脾益肾,温运脾阳一促无汤。

【考点 139】硬肿症:内因是肾阳虚衰,外因是感受寒邪。

【考点 140】硬肿症阳气虚衰证一益气温阳,通经活血一参附汤;寒凝血涩证一温经散寒,活血通络-与归四逆汤。

【考点 141】生理性黄疸出现时间:足月生后 2~3 日;早产儿 3~5 日。高峰时间:第 2 周 6 岁。
病理性黄疸出现时间:生后 24 小时以内。

【考点 142】黄疸变证：胎黄动风证一嗜睡，神昏，抽搐一平肝息风，利湿退黄-羚角钩藤汤。胎黄虚脱证一气促，神昏，四肢厥冷一大补元气，温阳固脱 T 参附汤合生脉散。

【考点 143】感冒夹痰-咳嗽痰多，喉间痰鸣。

风寒夹痰：三拗汤，二陈汤；风热夹痰：桑菊饮、黛蛤散。

会滞◆加保和丸（腹胀，不思饮食，呕吐酸腐）。

去惊一加镇惊丸（哭闹，甚至抽风，脉浮弦）。

【考点 144】乳蛾：风热搏结证一疏风清热，利咽消肿-银翘马勃散。

热毒炽盛证一清热解毒，利咽消肿 T 牛黄甘桔* O

脾胃阴虚证一养阴润肺，软坚利咽 T 养阴清肺汤。

【考点 145】肺炎喘嗽：阴虚肺热证一养阴清肺，润肺止咳 T 沙参麦冬汤。

脾胃气虚证一补肺益气，健脾化痰 T 人参五味子汤 O

【考点（46）】哮喘治疗原则：急则治其标，缓则治其本。

【考点 147】鹅口疮：心脾积热证一清心泻脾-清心泻脾散。虚火上浮证-滋阴降火-知柏地黄 丸。

【考点 148】口疮：风热乘脾证一疏风散火，清热解毒-银翘散。

【考点 149】乳蛾，顿咳，白喉，口疮和鹅口疮的鉴别：小儿口疮，以齿龈、舌体、两颊、上 腭等处出现黄白色溃疡，疼痛流涎，或伴发热为特征。鹅口疮是一种以口腔、舌上满布白屑为 主要临床特征的口腔疾病。以咽痛、吞咽困难为主要症状 c 阵发性痉挛咳嗽，咳后有特殊的鸡 血桂吸 气性吼声为特征。白喉 T 狗叫，所以犬吠样叫声。

【考点 150】泄泻变证：气阴两伤证一健脾益气，酸甘敛阴 T 人参乌梅汤。

阴竭阳脱证一挽阴回阳，救逆固脱 T 生脉散合参附龙牡救逆汤。

【考点 151】厌食和积滞均有不思乳食的表现，区别在干积滞有月完腹胀满的表现 C

【考点 152】厌食：脾失健运证一调和脾胃，运脾开胃-不换金正气散。

脾胃阴虚证一滋脾养胃，佐以助运-养胃增液汤、益胃汤。

脾胃气虚证一异功散、参苓白术散。

【考点 153】疳证常证：疳气证一不思饮食，精神欠佳，性急易怒，大便干稀不调-资生健脾丸。

疳积证-肚腹膨胀，性情烦躁，夜卧不宁-肥儿丸。

干疳证一皮包骨头，貌似老人，毛发干枯，面色白光白，精神萎靡，啼哭无力，腹凹如舟，杳不 思食一八珍汤。

疳证变证：疳肿胀证一面色无华，神疲乏力-防己黄芪汤合五苓散。

眼疳证一两目干涩，畏光羞明，眼角赤烂，甚则黑睛混浊，白翳遮睛一石斛夜光丸 c 口疳证一：舌生疮，甚或满口糜烂，秽臭难闻，面赤心烦，夜卧不宁-泻心导赤散。

【考点 154】营养性缺铁性贫血：小细胞低色素性贫血。

【考点 155】腹痛：腹部中寒证—温中散寒，理气止痛—养脏汤。

乳食积滞证—消食导滞，行气止痛 T 香砂平胃散。

胃肠结热证—通腑泄热，行气止痛 T 大承气汤。

【考点 156】便秘：食滞便秘—枳实导滞丸。血虚便秘—润肠丸。气滞便秘—六磨汤。

【考点 157】夜啼辨证重在辨别轻重缓急，寒热虚实。

脾寒气滞证—温脾散寒，行气止痛—乌药散合匀气散。

惊恐伤神证—定惊安神，补气养心—远志丸。

心经积热—清心导赤，泻火安神—导赤散。

【考点 158】汗证营卫失调证—遍身汗出—黄芪桂枝五物汤。

湿热迫蒸证—头部汗出—泻黄散。

【考点 159】病毒性心肌炎湿热侵心证—清热化湿，宁心复脉—葛根黄芩黄连汤。

痰瘀阻络证—豁痰化瘀，宁心通络—瓜蒌薤白半夏汤合失笑散。

【考点 160】惊风八候：搐、搦、掣、颤、反、弓、窜、视。高热、抽搐、神昏为主要症状。

急惊风：邪陷心肝—高热，头痛颈强，肢体抽搐，面色青—羚角钩藤汤。

气营两燔—病急，高热，狂躁不安，剧烈头痛，神昏抽搐—清瘟败毒饮。

慢惊风：脾虚肝亢证—嗜睡露睛，面色萎黄，不欲饮食，大便稀溏，色带青绿—缓肝理脾汤。脾肾

阳衰证—面白无华或灰滞，口鼻气冷，额汗不温，四肢厥冷—固真汤合逐寒荡惊汤。

【考点 161】痛病惊痫证—惊惕不安，如人将捕之状，四肢抽搐—镇惊丸。

痰痫证—发作时痰涎壅盛，喉间痰鸣，瞪目直视—一厘汤。

风痫证—颈项及全身强直，继而四肢抽搐，两目上视或斜视，牙关紧闭—定痫丸。

【考点 162】遗尿肾气不足证—温补肾阳，固涩膀胱—菟丝子散。

肺脾气虚证—补肺益脾，固涩膀胱—补中益气汤合缩泉丸。

【考点 163】五迟五软：心脾两虚证—健脾养心，补益气血—调元散。

【考点 164】麻疹临床特征

① 发热恶寒，咳嗽咽痛，鼻塞流涕，泪水汪汪，羞明畏光。

② 口腔两颊近臼齿处可见麻疹黏膜斑。

③ 周身皮肤依序布发红色斑丘疹，皮疹消退时皮肤有糠状脱屑和棕色色素沉着斑。C 麻疹首先要判断证型的 **Ifi 逆**。

邪犯肺卫证（初热期）—发热咳嗽，微恶风寒，喷嚏流涕，咽喉肿痛，两目红赤 T 宣毒发表汤。邪

入肺胃证（出疹期）—壮热持续，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤目多眵 T 青解透表汤 c 阴津

耗伤证（收没期）一**务点出齐后，发热渐退**，咳嗽渐减，疹点依次渐回，皮肤呈糠联状脱屑，并有色素沉着—**沙参麦冬汤 C**

【考点 165】奶麻，临床以持续高热 3~5 天，**热退疹出**为特征 c

【考点 166】丹痧邪侵肺卫证—**发热骤起，头痛畏寒**，肌肤无汗，咽喉红肿疼痛—**解肌透痧汤**。
毒炽气营证—**壮热不解**，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有**糜烂白腐**，皮疹密布—**凉营清气汤**。

【考点 167】水痘：发热，皮肤黏膜分批出现瘙痒性皮疹，**丘疹、疱疹、结痂同时存在**。
邪炽气营证—**疹色紫暗，疱浆混浊**—**清胃解毒汤**。

【考点 168】手足口病是由感受手足口病时邪引起的发疹性传染病，临床以**手足肌肤、口咽部发生疱疹**为特征。

【考点 169】症腮变证

邪陷心肝证—**壮热不退**，头痛项强，昏迷惊厥—**清热解毒，息风开窍—清瘟败毒饮、凉营清气汤**。毒窜睾腹证—**睾丸肿痛或少腹疼痛**—**龙胆泻肝汤**。

【考点 170】顿咳是小儿时期感受时行邪毒引起的肺系时行疾病，临床以阵发性痉挛咳嗽，咳后有特殊的**鸡鸣样吸气性吼声**为特征。

邪犯肺卫证（初咳期）—**日轻夜重**，痰稀白、量不多，或痰稠不易咯出，咳声不畅—**三拗汤**。痰火阻肺证（痉咳期）—一般痉咳 3 周后，可伴有**目睛红赤，两胁作痛**，舌系带溃疡—**髮自皮 汤合章苗大枣泻肺汤 C**

【考点 171】肠虫证—**面部白斑，白睛蓝斑**，唇内粟米状白点，夜寐齆齿—**使君子散**。
蛔厥证—**肢冷汗出**，恶心呕吐，常吐蛔虫—**乌压 L**。
虫痛证—病情持续不缓解者，见腹硬、压痛明显，**肠鸣，无矢气—驱蛔承气汤**。

【考点 172】紫癜风热伤络证一起病较急，全身皮肤紫癜散发，尤**以下肢及臀部居多**，呈对称性分布—疏风散邪，清热凉血—**连翘败毒散**。

血热妄行证一起病较急，皮肤出现瘀点瘀斑，**色鲜红 T 犀角地黄汤**。

【考点 173】夏季热暑伤肺胃证—**气温越高，体温越高**，皮肤灼热—**王氏清暑益气汤**。
上盛下虚证—一身热不退，**朝盛暮亏**，精神萎靡或虚烦不安—**清上泛**。

更多干货
扫码获取

