

考前电子卷（三）

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 下列关于手足口病的描述，错误的是
A. 发热，体温可达到 38°C 以上
B. 口腔黏膜，手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹
C. 疱疹处痒、痛，有结痂
D. 可伴有咳嗽、流涕、食欲不振、恶心、呕吐、头痛等症状
E. 肠道病毒 71 型可引起重症
2. 与血浆凝固酶阴性葡萄球菌无关的疾病是
A. 食物中毒
B. 败血症
C. 股骨头置换术后感染
D. 急性膀胱炎
E. 细菌性心内膜炎
3. 正常人腹部触诊时，不能触及的结构是
A. 胰腺
B. 骶骨岬
C. 横结肠
D. 腰椎椎体
E. 带粪块的乙状结肠
4. 下列关于情绪与情感特点的叙述，正确的是
A. 情绪较为稳定
B. 情感反应较持久
C. 情绪反应较深沉
D. 情感与生理性需要有关
E. 情感是人和动物共有的
5. 由患者的家长和家属或他人作出求医决的求医类型是
A. 主动
B. 被动
C. 强制
D. 稳定
E. 独立
6. 医学伦理学中尊重原则所涵盖的权利不包括
A. 自主选择权
B. 社会免责权
C. 个人隐私权
D. 知情同意权
E. 人格尊严权
7. 《医疗机构管理条例》规定的医疗机构执业规则是
A. 符合医疗机构的基本标准
B. 按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
C. 符合区域医疗机构设置规划
D. 能够独立承担民事责任
E. 可进行执业登记
8. 按照《献血法》的规定，表述错误的是
A. 血站是采集、提供临床用血的机构
B. 血站是不以营利为目的的公益性组织
C. 血站应当义务无偿为患者提供血液
D. 设立血站必须经省级以上人民政府卫生行政部门批准
E. 血站的管理办法由国务院卫生行政部门制定
9. 《精神卫生法》规定承担精神障碍患者再次诊断的精神科执业医师人数是
A. 5 人
B. 2 人
C. 4 人
D. 1 人
E. 3 人
10. 临床试验中的双盲法是指
A. 被观察者不知道分组情况和接受的治疗措施
B. 观察者不知道分组情况和接受的治疗措施
C. 被观察者与分析者均不知道分组情况和接受的治疗措施
D. 观察者和被观察者均不知道分组情况和接受的治疗措施
E. 观察者与分析者均不知道分组情况接受的治疗措施
11. 健康促进的核心策略包括
A. 保护环境
B. 职业卫生
C. 倡导、促成、协调
D. 疾病控制
E. 学校卫生

12.对青霉素治疗无效的病原微生物是

- A.革兰氏阳性球菌
- B.革兰氏阳性杆菌
- C.革兰氏阴性球菌
- D.铜绿假单胞菌
- E.梅毒螺旋体

13.肺炎病变部位没有空洞形成，常见于

- A.肺炎链球菌肺炎
- B.病毒性肺炎
- C.肺炎克雷伯杆菌肺炎
- D.金黄色葡萄球菌肺炎
- E.肺炎支原体肺炎

14.下列病变中，可表现为一侧胸廓膨隆且呼吸音消失的是

- A.胸廓畸形
- B.肺炎
- C.气胸
- D.肺气肿
- E.胸膜肥厚

15.单纯左心衰的典型体征是

- A.双下肢水肿
- B.双肺底湿啰音
- C.移动性浊音阳性
- D.肝压痛
- E.颈静脉怒张

16.二尖瓣关闭不全的特异性体征是

- A.胸骨左缘第2肋间连续性机器样杂音
- B.胸骨右缘第2肋间收缩期喷射样杂音
- C.心尖部全收缩期吹风样杂音
- D.胸骨左缘第3肋间舒张期叹气样杂音
- E.心尖部舒张中晚期隆隆样杂音

17.变异型心绞痛治疗宜选用

- A.比索洛尔
- B.地尔硫
- C.美托洛尔
- D.普萘洛尔
- E.卡维地洛

18.造成下肢深静脉血栓形成的相关因素不包括

- A.静脉损伤
- B.长期服用避孕药
- C.久病卧床
- D.妊娠
- E.脾功能亢进

19.早期诊断股骨头缺血性坏死最有价值的检查是

- A.CT
- B.X线

C.血管造影

D.MRI

E.B超

20.桡骨头半脱位的治疗措施是

- A.手法复位不必固定
- B.切开复位内固定
- C.切开复位韧带修复
- D.手法复位外固定
- E.切开复位外固定

21.心肺复苏时，胸外按压频率为

- A.80~100次/分
- B.100~120次/分
- C.60~80次/分
- D.70~90次/分
- E.90~110次/分

22.肾病综合征蛋白尿的分类属于

- A.肾小管性蛋白尿
- B.肾小球性蛋白尿
- C.溢出性蛋白尿
- D.组织性蛋白尿
- E.功能性蛋白尿

23.尿毒症患者贫血的最主要原因是

- A.慢性失血
- B.血红蛋白合成障碍
- C.红细胞寿命缩短
- D.促红细胞生成素缺乏
- E.铁及叶酸摄入不足

24.尿路感染最常见的感染途径是

- A.血行感染
- B.淋巴道感染
- C.下行感染
- D.上行感染
- E.直接感染

25.腺垂体功能减退所致垂体危象最紧急的治疗药物是

- A.高渗盐水
- B.促性腺激素
- C.甲状腺激素
- D.糖皮质激素
- E.升压药

26.改善急性左心衰竭症状最有效的药物是

- A.利尿剂
- B.洋地黄
- C.β受体阻滞剂
- D.钙通道阻滞剂
- E.血管紧张素转化酶抑制剂

2019 年临床执业助理真题

27.在骨骼肌兴奋-收缩耦联中起关键作用的是

- A. Na^+
- B. K^+
- C. Ca^{2+}
- D. Mg^{2+}
- E. Cl^-

28.胆汁中与消化有关最重要的物质是

- A. 消化酶
- B. 胆盐
- C. 卵磷脂
- D. 胆色素
- E. 脂肪酸

29.肉芽组织的作用不包括

- A. 抗感染创面
- B. 填补创口和组织缺损
- C. 机化渗出物
- D. 包裹渗出物
- E. 连接组织缺损, 保持器官完整性

30.慢性支气管炎的病变不包括

- A. 黏膜上皮鳞化
- B. 支气管腺体和杯状细胞增生
- C. 支气管内有大量泡沫细胞
- D. 支气管壁有大量慢性炎症细胞浸润
- E. 支气管软骨变性、萎缩

31.肾绞痛发作时, 首选治疗方法是

- A. 抗感染治疗
- B. 解痉止痛
- C. 局部外敷
- D. 口服中药
- E. 针灸

32.下列选项属于碳酸锂不良反应的是

- A. 瞳孔增大
- B. 呼吸抑制
- C. 共济失调
- D. 急性呼吸衰竭
- E. 周围神经炎

33.不能补充血糖的生化过程是

- A. 食物中糖类的消化吸收
- B. 肌糖原分解
- C. 糖异生
- D. 肝糖原分解
- E. 葡萄糖在肾小管的重吸收

34.人体合成尿素的主要器官是

- A. 脑
- B. 肌组织

C. 肾

D. 肝

E. 心

35.能够与胆红素结合形成结合胆红素的是

- A. 葡糖醛酸
- B. 胆汁酸
- C. 胆素原
- D. 珠蛋白
- E. 清蛋白

36.不属于黏膜相关淋巴组织的是

- A. 扁桃体
- B. 支气管相关淋巴组织
- C. M 细胞
- D. 脾
- E. 小肠派氏集合淋巴结

37.高位肠梗阻早期的典型临床表现是

- A. 呕吐粪样物
- B. 呕吐频繁但腹胀不明显
- C. 胃肠减压时胃液极少
- D. 腹胀明显但呕吐次数较少
- E. 腹部平片示“阶梯状”液平面

38.一碳单位代谢的辅酶是

- A. NADPH
- B. 二氢叶酸
- C. 四氢叶酸
- D. 叶酸
- E. NADH

39.唐氏综合征最常见的标准型染色体核型是

- A. 46, XY (或 XY), -14, +t (14q21q)
- B. 46, XY (或 XY), -21, +t (21q21q)
- C. 46, XY (或 XY), -22, +t (21q21q)
- D. 47, XX 或 (XY), +21
- E. 46, XY (或 XY) / 47, XY (或 XY), 21

40.痛最常发生的部位是

- A. 腿部
- B. 背部
- C. 面部
- D. 腰部
- E. 胸部

41.糖尿病最常见的神经病变是

- A. 周围神经炎
- B. 动眼神经麻痹
- C. 坐骨神经痛
- D. 自主神经病变
- E. 腕管综合征

42.慢性失血性贫血的外周血实验室检查特点是

- A.大细胞正色素性贫血
- B.小细胞低色素性贫血
- C.小细胞正色素性贫血
- D.大细胞低色素性贫血
- E.正细胞正色素性贫血

43.实施脑死亡标准的直接伦理目的是

- A.减轻家属的身心痛苦
- B.促进人体器官移植
- C.更科学的确定死亡
- D.节约卫生资源
- E.尊重患者死亡的权利

44.属于环境中二次污染物的是

- A.二手烟
- B.光化学烟雾
- C.镉
- D.二氧化碳
- E.汞

45.类风湿关节炎的主要表现是

- A.游走性大关节肿痛
- B.全身关节肿痛伴发热、皮疹者
- C.对称性小关节肿痛晨僵
- D.多关节肿痛伴四肢末梢感觉障碍
- E.腰骶痛伴晨僵

46.男, 78岁, 车祸后意识不清1小时, 查体: P20

次, BP130/70mmHg, 烦躁, 右眶周青紫, 双侧瞳孔直径2mm, 对光反射存在, 肢体可动。头颅CT示: 右侧散在高密度影, 脑中线结构未见明显移位, 最可能的诊断是

- A.脑挫裂伤
- B.脑震荡
- C.脑内血肿
- D.脑干损伤
- E.颅底骨折

47.患者女, 48岁, 近2年来出现关节炎症状和尿路结石, 进食肉类食物时, 病情加重, 该患者发生的疾病涉及的代谢途径是

- A.氨基酸代谢
- B.脂代谢
- C.嘌呤核苷酸代谢
- D.核苷酸代谢
- E.糖代谢

48.患者, 男, 65岁。2个月前有头外伤史, 现头痛。CT示右额颞叶新月形低密度影, 诊断是

- A.急性硬膜外血肿
- B.急性硬膜下血肿

C.慢性硬膜下血肿

D.脑内血肿

E.高血压脑出血

49.女, 16岁。3天来低热伴乏力、纳差、恶心、呕吐, 来诊当日家长发现巩膜黄染。出生时曾注射乙肝疫苗。实验室检查: ALT 860U/L, Tbill 20umol/L。最可能的诊断是

- A.戊型肝炎
- B.丁型肝炎
- C.丙型肝炎
- D.乙型肝炎
- E.甲型肝炎

50.女, 62岁。右侧腹股沟疝嵌顿10小时。查体: 腹胀明显, 右下腹局限性压痛(+), 肌紧张, 肠鸣音亢进。右侧腹股沟韧带下方隆起肿块, 有压痛。手术时发现小肠坏死, 行坏死小肠切除肠吻合术后, 下一步正确的手术措施是

- A.单纯疝囊高位结扎术
- B.McVay法疝修补术
- C.Bassini法疝修补术
- D.Halsted法疝修补术
- E.Ferguson法疝修补术

51.左肱骨干上1/3骨折, 近折端向前、向内移位, 远折端向外、向近端移位。造成这种骨折移位的最主要因素是

- A.肌肉的牵拉力
- B.暴力的大小
- C.搬运固定不当
- D.暴力的性质
- E.肢体的重量

52.男, 46岁。乘汽车时发生车祸, 伤后右髋关节疼痛剧烈, 活动受限。查体: 患肢短缩, 呈屈曲、内收、内旋畸形, 应首先考虑的诊断是

- A.髋关节结核
- B.髋关节脱位
- C.髋关节骨折
- D.股骨干骨折
- E.股骨颈骨折

53.男, 56岁, 上腹不适6年, 上腹痛伴早饱。嗝气2个月, 口服法莫替丁后疼痛减轻。胃镜及胃黏膜活组织病理检查提示胃窦中度慢性萎缩性胃炎伴轻度异型增生, ¹³C尿素呼气试验阳性, 最适宜的处理措施是

- A.口服奥美拉唑, 定期复查胃镜
- B.胃大部切除术, 术后根除幽门螺杆菌
- C.根除幽门螺杆菌, 定期复查胃镜

2019 年临床执业助理真题

D.口服黏膜保护剂及消化酶，定期复查胃镜

E.口服多潘立酮及消化酶，定期复查胃镜

54.女，28岁，G2P1。停经2月余，阴道少量流血10天。妇科检查：宫体如4个月妊娠大小。B超显示宫腔内充满落雪状光点，未测到胎体和胎盘回声，双附件区探及直径5cm大小无回声包块，初步诊断是

A.双侧卵巢肿瘤

B.稽留流产

C.羊水过多

D.葡萄胎

E.绒癌

55.女，16岁，月经周期紊乱1年，伴经量多少不一，经期长短不定。基础体温单向。首先考虑的诊断是

A.无排卵性功能失调性子宫出血

B.排卵性功能失调性子宫出血

C.特纳综合症

D.卵巢早衰

E.子宫内膜异位症

56.女，32岁，进行性痛经8年加重3年，婚后4年未孕。查体：子宫后位，大小正常，子宫左后方可触及大小约6cm的囊性包块，张力较大，触痛。血CA125：50U/ml，抗子宫内膜抗体(+)。首先应考虑的诊断是

A.盆腔炎症性包块

B.盆腔结核

C.转移性卵巢肿瘤

D.卵巢上皮癌

E.子宫内膜异位症

57.男孩，1岁半。出生后半年出现尿有骚臭味，经常呕吐，1岁时发现智力较同龄儿落后。查体：目光呆滞，皮肤白皙，毛发浅黄。为明确诊断需进行的检查是

A.血苯丙氨酸浓度测定

B.血T₃、T₄测定

C.染色体核型分析

D.头颅CT

E.脑电图

58.男，35岁。腰痛伴右侧下肢放射性痛3个月，无明显发热、盗汗。查体：右侧直腿抬高试验阳性，小腿前外侧和足底感觉减退，腰背伸肌力减退。最可能的诊断是

A.腰椎间盘突出

B.腰肌劳损

C.腰椎肿瘤

D.腰椎结核

E.强直性脊柱炎

59.男，68岁。反复咳嗽、咳痰、气促41年，心悸、水肿5年，近1周来症状加重入院。查体：呼吸急促，双肺可闻及干湿啰音，P₂亢进，三尖瓣区闻及3/6级收缩期杂音。肝右肋下4cm，压痛(+)，肝颈静脉回流征阳性，下肢水肿。此时首选的治疗是使用

A.强心剂

B.利尿剂

C.心血管扩张剂

D.抗生素

E.祛痰药

60.男孩，8月龄。3天来腹泻6~8次/天，为黄色水样便，呕吐3~5次/天，为胃内容物，尿量减少，哭时少泪。查体：精神萎靡，口唇干燥，呼吸略深长，皮肤弹性差，眼窝及前囟明显凹陷。实验室检查：血钠132mmol/L。最可能的诊断是

A.重度低渗性脱水

B.中度低渗性脱水

C.中度等渗性脱水

D.重度等渗性脱水

E.轻度等低渗性脱水

61.男，58岁。反复咳嗽、咳痰10年，近两年出现气促，逐渐加重。查体：桶状胸，叩诊过清音，双肺呼吸音减低。最可能的诊断是

A.慢性支气管炎

B.阻塞性肺气肿

C.慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿

D.支气管扩张症

E.支气管哮喘

62.男，65岁。慢性阻塞性肺疾病患者，因受凉后咳嗽、咳痰伴呼吸困难加重2天入院。查体：坐位，喘息貌，球结膜轻度水肿，口唇发绀。双肺可闻及散在哮鸣音，肺底少许湿啰音。动脉血气分析：pH7.21，PaCO₂55mmHg，PaO₂62mmHg。该患者宜采取的治疗措施为

A.储氧面罩吸氧

B.有创通气

C.鼻导管吸氧

D.普通面罩吸氧

E.无创通气

63.男，34岁。间断咳血5年。曾行胸部CT，示右肺中叶和左肺下叶囊状支气管扩张。近2年咳血频

率逐渐增加，曾3次因为大咯血住院治疗。经静脉滴注垂体后叶素及抗感染治疗控制。患者希望更好地控制咯血，最适宜的医疗建议是

- A.手术治疗
- B.支气管镜介入治疗
- C.注射肺炎球菌疫苗
- D.支气管动脉栓塞术
- E.注射流感疫苗

64.患者1个月前发热、胸痛、咳嗽，有大量脓痰，经抗感染治疗不见好转，1周前咳嗽加重，并有呼吸困难。胸部X线片见左胸大片状阴影，经胸腔穿刺抽出脓液，反复穿刺排脓不能控制。其治疗应为

- A.抗炎，补液
- B.继续胸腔穿刺并注入抗生素
- C.开放引流
- D.纤维板切除术
- E.低位胸腔闭式引流

65.女，30岁。畏寒、高热、咳嗽5天。查体：右上肺语颤增强，呼吸音减弱。实验室检查：血WBC $15.2 \times 10^9/L$ ，N0.92，该患者最可能的诊断是

- A.支气管扩张
- B.病毒性肺炎
- C.肺炎链球菌肺炎
- D.干酪性肺炎
- E.肺炎支原体肺炎

66.男，28岁。建筑工人，从脚手架跌下伤及会阴部，3小时后不能自行排尿且有尿外渗。尿外渗的范围多局限在

- A.腹腔
- B.会阴及阴囊
- C.膀胱周围
- D.前列腺周围
- E.耻骨后间隙

67.女，15岁。左小腿近端持续性疼痛3个月，夜间加重。查体：左小腿近端局部肿胀、皮温增高。X线片示左胫骨上段日光射线样改变。最可能的诊断是

- A.骨结核
- B.骨囊肿
- C.骨巨细胞瘤
- D.骨肉瘤
- E.骨软骨瘤

68.女，17岁。鼻塞、流涕、咽痛、发热1天后出现肉眼血尿，伴面部水肿。BP140/100mmHg，尿蛋白(++++)。为明确诊断，最有价值的进一步检查是

- A.双肾CT

- B.肾脏B超
- C.24小时尿蛋白定量
- D.肾活检
- E.尿培养

69.男，78岁。水肿、大量蛋白尿3周余。肾活检示膜性肾病，近2天出现右下肢水肿加重，腰痛。应首先考虑的并发症是

- A.动脉栓塞
- B.痛风发作
- C.静脉血栓
- D.静脉曲张
- E.淋巴管炎

70.女，42岁。肉眼血尿1月余。静脉尿路造影(IVU)显示双肾功能正常，右肾盂有充盈缺损

1.5cm×1.2cm。尿细胞学检查发现肿瘤细胞，治疗方法首选

- A.放疗
- B.右肾+输尿管全切术
- C.化疗
- D.右肾切除术
- E.肿瘤切除术

71.男，68岁。近1周晨起锻炼时感胸痛，持续10余分钟，休息后可缓解，1年前体检时发现HbA1c为8.3%。查体未见明显异常。胸痛发作时心电图示V₁~V₆导联ST段压低。该患者胸痛最可能的病因是

- A.心绞痛
- B.肋软骨炎
- C.肥厚型心肌病
- D.心肌梗死
- E.肺血栓栓塞

72.女，35岁。左胸持续性疼痛5天，平卧位时加重。心电图：aVR导联ST段压低，其余导联ST段凹面向上抬高。血清肌酸磷酸激酶正常。最可能的诊断为

- A.病毒性心肌炎
- B.急性心包炎
- C.急性心肌梗死
- D.扩张型心肌病
- E.变异型心绞痛

73.男，38岁。脓毒性休克患者。动脉血气分析示代谢性酸中毒、I型呼吸衰竭。下列治疗措施中可能造成组织缺氧加重的是

- A.静脉滴注小剂量多巴胺
- B.静脉滴注糖皮质激素
- C.补充胶体液
- D.快速补充碳酸氢钠

2019 年临床执业助理真题

E.快速补充晶体液

74.男, 45 岁。右下肢静脉迂回曲张 10 年。近期出现右下肢酸胀感, 白天活动后肿胀, 晨起消失, 右下肢踝部轻度水肿, 足靴区皮肤色素沉着。查体: 大腿下 1/3 内侧及小腿后方浅静脉明显扩张、迂曲, 大隐静脉瓣膜功能试验 (+), 深静脉通畅试验 (-), 交通静脉瓣膜功能试验 (-)。该患者最可能的诊断是

- A.动静脉瘘
- B.单纯性下肢静脉曲张
- C.血栓性浅静脉炎
- D.原发性下肢深静脉瓣膜功能不全
- E.下肢深静脉血栓形成

75.男, 40 岁, 装卸工。腰扭伤, 经治疗腰痛缓解, 但仍有左下肢麻木并放射。查体: 腰背肌痉挛, 沿坐骨神经走行有压痛, 直腿抬高试验阳性。最可能的诊断是

- A.腰部棘上韧带炎
- B.腰椎结核
- C.腰椎骨髓炎
- D.单纯坐骨神经痛
- E.椎间盘突出症

76.男, 71 岁。咳嗽、咳痰 20 年, 气短 2 天, 高血压病史 20 年。查体: T37.5℃, BP150/90mmHg, 半坐位, 口唇发绀, 呼气相延长, 双肺可闻及干湿啰音, 心界向左下扩大, 心率 120 次/分, 律齐。为改善患者的临床症状, 下列药物应首选的是

- A.毛花苷 C (西地兰)
- B.氨茶碱
- C.肾上腺素
- D.吗啡
- E.呋塞米

77.男, 28 岁。阵发性心慌 3 年, 每次心慌突然发生, 持续半小时至 3 小时不等。发作时心律齐, 200 次/分, 按摩颈动脉窦心律能突然减慢至正常。心电图: QRS 波形态正常, P 波不明显。诊断为

- A.心房扑动
- B.窦性心动过速
- C.心房颤动
- D.阵发性室上性心动过速
- E.阵发性室性心动过速

78.男, 75 岁。高血压病史 16 年, 平素血压 170/70mmHg。实验室检查: 空腹血糖 5.6mmol/L, 血肌酐 180umol/L; 尿蛋白 (++)。该患者的收缩压至少控制在

- A.130mmHg 以下
- B.110mmHg 以下
- C.140mmHg 以下
- D.120mmHg 以下
- E.150mmHg 以下

79.女, 18 岁。心慌、怕热、多汗、体重下降 3 个月。双手有细颤, 突眼不明显, 甲状腺 II 度弥漫性肿大、质地软、有血管性杂音, 心率 108 次/分, 两肺呼吸音清, 考虑为 Graves 病。为明确诊断, 首先要检查

- A.甲状腺摄碘率
- B.血 TSH、FT₃、FT₄
- C.抗甲状腺球蛋白抗体 (TgAb)
- D.甲状腺 B 超
- E.甲状腺放射性核素扫描

80.女, 72 岁。糖尿病病史 8 年, 瑞格列奈 2mg, tid, 近期血糖控制不佳, 既往高血压病史 10 年, 冠心病病史 5 年。身高 158cm, 体重 50kg, BMI 20kg/m², 实验室检查: 空腹血糖 12.5mmol/L; 三餐后 2 小时血糖分别为 7.8mmol/L、8.4mmol/L 和 8.8mmol/L; 夜间血糖 10.5mmol/L; 糖化血红蛋白 9.2%, 目前最适宜的治疗是加用

- A.噻唑烷酮类降糖药
- B.胰岛素
- C.双胍类降糖药
- D.α-葡萄糖苷酶抑制剂
- E.磺脲类降糖药

81.男, 60 岁。急性重症胰腺炎保守治疗中, 无尿 3 天。查体: BP180/92mmHg, P120 次/分, 双下肺满布细湿啰音。实验室检查: 血钾 6.9mmol/L, BUN25.2mmol/L。血肌酐 577umol/L。目前应采取的最有效治疗手段是

- A.静脉滴注甘露醇利尿
- B.口服甘露醇或硫酸镁导泻
- C.紧急血液透析
- D.袢利尿剂静脉注射
- E.控制入液量, 停止补钾

82.男, 18 岁。平素体健, 因偶尔碰伤后流血不止, 经检查诊断为血友病甲型, 该患者缺乏的因子

- A.VIII 因子
- B.IX 因子
- C.XI 因子
- D.VII 因子
- E.V 因子

83.男, 32 岁。因肝损伤急诊手术。曾患甲型肝炎已

治愈。术中见肝右叶外侧 5cm 裂口，深 3cm。术后肝肾功能检查正常，食欲、体力恢复正常。肝脏损伤得以顺利修复，从内环境分析，主要起再生作用的是

- A. 不稳定细胞
- B. 肥大细胞
- C. 纤维细胞
- D. 稳定细胞
- E. 永久性细胞

84. 女，32 岁。患者神经衰弱 3 月余，未经治疗，主要表现头痛、失眠、脑力疲乏、精神易兴奋。药物治疗应选择

- A. 地西洋
- B. 氯氮平
- C. 利培酮
- D. 喹硫平
- E. 氯丙嗪

85. 男，70 岁。进行性排尿困难 3 年，加重伴尿失禁 2 天。此尿失禁为

- A. 充盈性尿失禁
- B. 压力性尿失禁
- C. 真性尿失禁
- D. 混合性尿失禁
- E. 急迫性尿失禁

86. 女，68 岁。右膝关节疼痛，行走困难 10 年余。查体：右膝关节内翻畸形，屈曲挛缩。X 线检查：右膝内侧关节间隙严重狭窄，髌骨关节面严重磨损。最适合的治疗方法是

- A. 人工膝关节置换术
- B. 消炎镇痛药物
- C. 膝关节融合术
- D. 关节内注射透明质酸酶
- E. 关节镜下清理术

A3/A4 型选择题

(87~88 题共用题干)

男，45 岁。近 10 年间断出现情绪低落，高兴不起来，话少；兴趣减退，对既往喜欢的事情也不愿意去做；脑子反应迟钝，记忆力下降，记不住事情，工作效率低，伴有躯体不适，感觉浑身无力、头痛；胃不舒服，食欲减退；睡眠差，主要为早醒；存在悲观厌世，觉得活着没意思；曾多次自杀未遂，每次发作持续 3 个月；缓解期生活、工作如常；近一个月复发，症状表现如既往发作，但更严重。

87. 该患者首先考虑的诊断是

- A. 恶劣心境
- B. 复发性抑郁障碍
- C. 双相障碍
- D. 躯体形式障碍
- E. 脑衰弱综合征

88. 针对该患者，首选的治疗是

- A. 大剂量抗精神病药治疗
- B. 电抽搐治疗
- C. 大剂量苯二氮 类药物
- D. 大剂量抗抑郁药治疗
- E. 心理治疗

(89~91 题共用题干)

女，54 岁。绝经后 4 年，出现阴道不规则出血

1 个月。妇科检查：发现宫颈肥大，宫口处有菜花状赘生物，大小约 2cm×1cm×1cm，接触性出血 (+)，子宫稍小，活动，双侧附件 (-)，双侧宫颈旁组织无异常。

89. 该患者的诊断首先考虑

- A. 子宫颈肌瘤
- B. 卵巢肿瘤
- C. 子宫颈息肉
- D. 子宫内膜癌
- E. 子宫颈癌

90. 首选的辅助检查是

- A. HPV 检测
- B. 宫颈活检
- C. 分段诊刮
- D. 宫腔镜
- E. 阴道镜

91. 如果明确诊断后，首选的治疗方法是

- A. 观察
- B. 激素治疗
- C. 放疗
- D. 手术
- E. 化疗

(92~94 题共用题干)

女婴，10 月龄。腹泻伴呕吐 5 天。大便 10 余次

2019 年临床执业助理真题

每天，呈蛋花汤样，呕吐 2~3 次每天，尿量减少。
查体：体重 8kg，眼窝凹陷，皮肤弹性差，四肢尚暖。实验室检查：血钠 125mmol/L；粪便镜检示 WBC0~2/HP。

92.该患儿可能的诊断是

- A.轮状病毒肠炎
- B.金黄色葡萄球菌肠炎
- C.空肠弯曲菌肠炎
- D.抗生素相关性腹泻
- E.真菌性肠炎

93.该患儿腹泻脱水的程度与性质是

- A.重度低渗性脱水
- B.中度等渗性脱水
- C.中度低渗性脱水
- D.轻度低渗性脱水
- E.轻度等渗性脱水

94.第 1 天补液所采用的液体种类是

- A.1/4 含钠液
- B.1/3 含钠液
- C.1/2 含钠液
- D.2/3 含钠液
- E.等张含钠液

(95~97 题共用题干)

男，54 岁。腹胀、呕吐 1 周。每次呕吐量约 1500ml，呕吐物为隔夜宿食及大量黏液，并有酸臭味，不含胆汁。呕吐后腹胀症状能明显缓解。十二指肠肠球部溃疡病史 20 年。查体：上腹膨隆，可见胃型及蠕动波，腹软，无局限性压缩和反跳痛，移动性浊音 (-)，肠鸣音活跃。

95.最可能的诊断是

- A.幽门梗阻
- B.回肠梗阻
- C.结肠梗阻
- D.十二指肠肠梗阻
- E.空肠梗阻

96.确诊最有意义的检查是

- A.腹部 B 超
- B.腹部 MRI
- C.腹部 CT
- D.立位腹部 X 线平片
- E.胃镜

97.下列处置措施错误的是

- A.持续胃肠减压
- B.纠正脱水和补钾
- C.静脉输注碳酸氢钠

D.温生理盐水洗胃

E.改善营养状况

(98~99 题共用题干)

女，25 岁。人工流产术中出现血压下降，心率减慢，面色苍白。

98.应诊断为

- A.人工流产综合反应
- B.子宫穿孔
- C.栓塞
- D.漏吸
- E.吸宫不全

99.处理方法应是

- A.输液
- B.肌注催产素
- C.立即剖腹探查
- D.静注阿托品
- E.不应停止操作

(100~101 题共用题干)

某小学，6 月一次中午进食火腿汉堡包、粥、煮鸡蛋、炒空心菜、萝卜干，4 小时后，部分同学出现头痛、恶心、呕吐、食欲减退、腹泻、腹痛，个别有发热，体温 38~40℃。

100.引起食物中毒的可能病原菌是

- A.沙门菌
- B.副溶血性弧菌
- C.葡萄球菌肠毒素
- D.变形杆菌
- E.黄曲霉毒素

101.引起食物中毒的食品可能是

- A.火腿汉堡包
- B.粥
- C.煮鸡蛋
- D.炒空心菜
- E.萝卜干

(102~103 题共用题干)

男孩，1 岁。面色苍白 2 个月，出生后母乳喂养至今，未规律添加辅食，平日易感冒。查体：发育营养稍差，皮肤黏膜苍白，无黄疸，浅表淋巴结不大，心前区可闻及 2 级收缩期杂音，肝脾无肿大。血常规：Hb85g/L，RBC $3.5 \times 10^{12}/L$ ，MCH24pg，MCHC0.28，WBC、PLT 正常。

102.该患儿最可能的诊断是

- A.营养性巨幼细胞贫血
- B.感染性贫血
- C.缺铁性贫血

- D.溶血性贫血
- E.再生障碍性贫血

103.为进一步确诊,首选的检查是

- A.抗碱血红蛋白测定
- B.骨髓检查
- C.叶酸,维生素B测定
- D.铁代谢指标测定
- E.血红蛋白电泳

(104~106题共用题干)

男,56岁。近1周来“上呼吸道感染”后出现呼吸困难,夜间为著,可自行缓解,白天症状不明显。既往高血压病史10年,血压控制欠满意,已戒烟10年。过敏性鼻炎病史5年。门诊心肺检查及胸部X线片未见异常,行超声心动图检查未见异常。

104.该患者首先考虑的诊断是

- A.慢性阻塞性肺疾病
- B.支气管哮喘
- C.心力衰竭
- D.睡眠呼吸暂停综合征
- E.冠心病

105.为明确诊断,应首先采取的检查是

- A.肺功能
- B.睡眠呼吸监测
- C.胸部CT
- D.冠状动脉CT血管造影术
- E.动脉血气分析

106.该患者入院后仍间断发作憋气,在进行检查和临床观察时应特别关注的是

- A.症状缓解时的活动耐力
- B.上呼吸道检查
- C.血压波动情况
- D.发作时心肺体征
- E.有无杵状指

(107~108题共用题干)

男,46岁。体检发现血压升高6个月。查体:血压150/100mmHg,心率86次/分,律齐。实验室检查:血肌酐96 μ mol/L,血尿酸500 μ mol/L。

107.患者控制血压的目标值是血压低于

- A.140/80mmHg
- B.120/70mmHg
- C.130/90mmHg
- D.140/90mmHg
- E.130/80mmHg

108.该患者不宜选用的降压药是

- A. β 受体拮抗剂
- B.噻嗪类利尿剂
- C.血管紧张素转换酶抑制剂
- D.钙通道阻滞剂
- E.血管紧张素II受体拮抗剂

(109~110题共用题干)

女,48岁。因胆道梗阻并发休克入院。使用去甲肾上腺素升压,血压不易维持,波动较大,应用氢化可的松后血压升高并维持平稳,治疗3天时,患者出现精神失常、躁狂。

109.患者出现精神失常、躁狂,因氢化可的松

- A.提高中枢神经的兴奋性
- B.加速蛋白质的分解代谢
- C.减少脑组织对葡萄糖的利用
- D.过量引起感染的扩散
- E.增强升压药的作用

110.加用氢化可的松后,去甲肾上腺素升压作用增强的这种现象称为

- A.糖皮质激素的允许作用
- B.两种药物作用的协同
- C.糖皮质激素的刺激作用
- D.糖皮质激素的抗感染作用
- E.两种药物作用的叠加

(111~112题共用题干)

男孩,12岁。发热2天,伴头痛、意识不清1天,8月中旬来诊。查体: T39.5 $^{\circ}$ C,意识不清,克氏征、布氏征(+).实验室检查:血 WBC $16\times 10^9/L$ 。

111.最可能的诊断是

- A.疟疾
- B.钩端螺旋体病
- C.流行性脑脊髓膜炎
- D.中毒型菌痢
- E.流行性乙型脑炎

112.为确诊应进行的检查是

- A.钩端螺旋体显凝试验
- B.血涂片找疟原虫
- C.血培养
- D.脑脊液常规及培养
- E.血清特异性IgM抗体

B1型选择题

2019 年临床执业助理真题

(113~114 题共用备选答案)

- A. 抗 SSA 抗体
- B. 抗磷脂抗体
- C. 抗 Sm 抗体
- D. 抗 CCP 抗体
- E. 抗核抗体

113. 系统性红斑狼疮的标志性抗体是

114. 类风湿性关节炎的有重要意义的

(115~116 题共用备选答案)

- A. 空腹血糖 5.5mmol/L, 餐后 2 小时血糖 7.2mmol/L
- B. 空腹血糖 5.8mmol/L, 餐后 2 小时血糖 10.2mmol/L
- C. 空腹血糖 6.8mmol/L, 餐后 2 小时血糖 7.5mmol/L
- D. 空腹血糖 7.8 mmol/L, 餐后 2 小时血糖 11.5mmol/L
- E. 空腹血糖 2.7mmol/L, 餐后 2 小时血糖 3.9mmol/L

115. 属于正常血糖水平的是

116. 可诊断糖尿病的血糖水平是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 收缩压升高, 舒张压降低
- B. 主要为收缩压升高
- C. 收缩压降低, 舒张压升高
- D. 收缩压与舒张压均升高
- E. 主要为舒张压升高

117. 严重甲状腺功能亢进患者的动脉血压变化的特点是

118. 正常老年人动脉血压的生理性变化特点是

(119~120 题共用备选答案)

- A. 乳头状细胞癌
- B. 透明细胞癌
- C. 横纹肌肉瘤
- D. 移行细胞癌
- E. 腺癌

119. 膀胱肿瘤最常见的组织学类型是

120. 肾癌最常见的组织学类型是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 肥大细胞
- B. 主细胞
- C. G 细胞
- D. 壁细胞
- E. 黏液细胞

121. 泌促胃液素的细胞是

122. 分泌组胺的细胞是

(123~124 题共用备选答案)

- A. α -酮戊二酸

B. 乙酰乙酸

C. 肌醇

D. 胆汁酸

E. 琥珀酰 CoA

123. 可以直接转变为谷氨酸的是

124. 属于酮体的是

(125~126 题共用备选答案)

A. 试插导尿管

B. 尿道造影

C. 尿道探子

D. B 超

E. 尿道镜检查

125. 确定尿道损伤部位及程度, 应选用的方法是

126. 检查尿道是否连续、完整, 首选的方法是

(127~128 题共用备选答案)

A. 常有妄想

B. 早期出现人格改变

C. 有意识障碍

D. 有记忆障碍和智能障碍

E. 常有错觉、幻觉

127. 阿尔茨海默病和血管性痴呆的共同点

128. 阿尔茨海默病区别于血管性痴呆的特点是

(129~130 题共用备选答案)

A. 托马斯征阳性

B. 拾物试验阳性

C. 直腿抬高试验和加强试验阳性

D. 患部活动受限, 好发于 50 岁左右

E. 早期局部分层穿刺有助于诊断

129. 肩关节周围炎

130. 腰椎间盘突出症

(131~132 题共用备选答案)

A. 酪氨酸转氨酶缺乏

B. 苯丙氨酸转氨酶缺乏

C. 苯丙氨酸羟化酶缺乏

D. 酪氨酸羟化酶缺乏

E. 二氢生物蝶呤还原酶缺乏

131. 典型苯丙酮尿症的发病原因是

132. 非典型苯丙酮尿症的发病原因是

(133~134 题共用备选答案)

A. 中上腹痛、体重下降、贫血

B. 上腹痛、饥饿及夜间进食后缓解

C. 上腹痛、呕逆

D. 反酸、胃灼热、胸骨后疼痛

E. 右上腹痛、黄疸、贫血

133. 十二指肠溃疡的典型临床表现是

134.胃食管反流病的主要临床表现是

(135~136 题共用备选答案)

- A.小肠液
- B.胆汁
- C.胰液
- D.唾液
- E.胃液

135.对食物消化能力最强,功能全面的消化液是

136.缺乏时易引起脂肪泻的消化液是

(137~138 题共用备选答案)

- A.结核分枝杆菌
- B.病毒
- C.肺炎克雷伯杆菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.肺炎链球菌

137.男,26岁。高热、右胸痛3天。胸部X线示右下肺大片状阴影。该患者感染的病原体可能是

138.女,30岁。低热、干咳1个月。胸部X线示后上肺尖后段淡薄阴影。该患者感染的病原体可能是

(139~140 题共用备选答案)

- A.格列本脲
- B.瑞格列奈
- C.二甲双胍
- D.胰岛素
- E.普萘洛尔

139.能抑制肠道对葡萄糖的吸收,主要用于2型糖尿病伴肥胖的药物是

140.糖尿病伴有严重感染治疗首选

(141~142 题共用备选答案)

- A.滑动性疝
- B.易复性疝
- C.嵌顿性疝
- D.绞窄性疝
- E.难复性疝

141.疝内容物动脉搏动消失,肠壁失去蠕动的疝是

142.平卧后能还纳的疝是

(143~144 题共用备选答案)

- A.输尿管镜碎石取石
- B.体外冲击波碎石
- C.经皮肾镜碎石取石
- D.膀胱镜碎石
- E.药物治疗

143.右肾盂结石直径1.8cm,肾功能正常,输尿管通畅,治疗应首选

144.右输尿管中段结石大小约1.2cm×0.8cm,体型肥胖,治疗应首选

(145~146 题共用备选答案)

- A.高盐饮食
- B.优质高蛋白质饮食
- C.优质正常蛋白质饮食
- D.高脂饮食
- E.优质低蛋白质饮食

145.肾病综合征患者应选用

146.慢性肾衰竭未透析的患者应选用

(147~148 题共用备选答案)

- A.肠激酶
- B.淀粉酶
- C.胰脂肪酶
- D.胃蛋白酶
- E.胰蛋白酶

147.与初始激活胰蛋白酶原相关的消化酶是

148.与激活糜蛋白酶原相关的消化酶是

(149~150 题共用备选答案)

- A.筛检的效率降低
- B.假阴性率下降
- C.患病率下降
- D.可靠性增加
- E.特异度升高

149.随着筛检试验的灵敏度升高

150.联合试验中全部试验,结果均为阳性时才判定为阳性,这样做可以使

第二单元

A1/A2 型选择题

1.与SLE的疾病活动性有关的免疫学检测指标是

- A.抗核抗体
- B.抗双链DNA抗体
- C.抗Sm抗体
- D.抗SSA抗体

E.抗中性粒细胞胞质抗体

2.有关变性蛋白质的主要特点是

- A.不易被蛋白酶水解
- B.共价键被破坏
- C.溶解性增加

2019 年临床执业助理真题

- D.生物学活性丧失
E.分子量降低
- 3.有关糖皮质激素的作用是
A.促进葡萄糖的利用
B.减少红细胞和淋巴细胞的数目
C.减少脂肪的分解
D.促进肌肉组织蛋白质分解
E.降低机体抗伤害刺激的能力
- 4.遗忘综合征的表现不包括
A.智能相对完好
B.意识障碍
C.近事记忆障碍
D.虚构
E.定向力障碍
- 5.在一个心动周期中，下列哪个时期主动脉压最低
A.减慢充盈期末
B.等容舒张期末
C.等容收缩期末
D.快速充盈期末
E.心房收缩期末
- 6.桥接坏死主要见于
A.中、重度慢性肝炎
B.亚急性重型肝炎
C.急性重型肝炎
D.急性普通型肝炎
E.轻度慢性肝炎
- 7.在活体的心脏或血管内，血液发生凝固或血液中某些有形成分互相聚集形成的固体质块是
A.淤血
B.栓塞
C.血栓
D.栓子
E.凝血
- 8.可引起周围神经炎的药物是
A.吡嗪酰胺
B.异烟肼
C.阿昔洛韦
D.利福平
E.卡那霉素
- 9.解热镇痛药的解热作用机制是
A.增加中枢 PG 释放
B.抑制外周 PG 合成
C.增加中枢 PG 合成
D.抑制外周 PG 降解
E.抑制中枢 PG 合成
- 10.下列对心房颤动无治疗作用的药物是
A.维拉帕米
B.奎尼丁
C.利多卡因
D.强心苷
E.普萘洛尔
- 11.属于第二级预防措施的是
A.病后康复
B.疾病筛检
C.遗传咨询
D.健康促进
E.接种疫苗
- 12.说明样本均数抽样误差大小的指标是
A.标准差
B.四分位数间距
C.极差
D.变异系数
E.标准误
- 13.下列对病因不明的疾病，描述性研究的主要任务是
A.验证病因
B.研究发病机制
C.确定病因
D.因果推断
E.寻找病因的线索，提出病因假设
- 14.思维是属于心理活动的
A.情感过程
B.认知过程
C.意志过程
D.人格倾向
E.人格特征
- 15.绒毛膜癌最常继发于
A.早产
B.自然流产
C.葡萄胎
D.异位妊娠
E.正常分娩
- 16.医疗机构从业人员的基本行为规范是
A.以人为本
B.人道行医
C.大医精诚
D.救死扶伤
E.为人民健康服务
- 17.医学伦理学的研究对象是
A.医德基本实践

- B. 医德基本理论
- C. 医学道德关系
- D. 医学道德难题
- E. 医德基本规范

18. 对涉及人的生物医学研究进行伦理审查的根本目的是

- A. 保护受试者的尊严和权利
- B. 维护研究机构的科研利益
- C. 尊重研究者的基本权利
- D. 确保医学科研的规范性
- E. 保护受试者的经济利益

19. 痛风的好发部位为

- A. 第一跖趾关节
- B. 颈椎关节
- C. 膝关节
- D. 踝关节
- E. 腰椎关节

20. 肩关节前脱位首选的治疗方法是

- A. 皮肤牵引
- B. 骨牵引
- C. 悬吊牵引
- D. 手法复位外固定
- E. 手术切开复位内固定

21. 每张西药、中成药处方开具的药品种类上限是

- A. 5 种
- B. 3 种
- C. 6 种
- D. 4 种
- E. 8 种

22. 缺铁性贫血患儿服用铁剂后，最早的治疗反应是

- A. 烦躁等精神症状减轻
- B. 网织红细胞计数增加
- C. 血红蛋白增加
- D. 骨髓铁染色恢复正常
- E. 皮肤苍白改善

23. Killip 分级，心功能 III 级指

- A. 未闻及肺部啰音和第三心音
- B. 肺部有啰音但啰音的范围小于 1/2 肺野
- C. 肺部有啰音且啰音的范围大于 1/2 肺野（肺水肿）
- D. 肺部可闻及散在的哮鸣音
- E. 血压 < 70/40mmHg

24. 心搏骤停早期诊断的最佳指标是

- A. 呼吸停止
- B. 测不到血压
- C. 颈动脉和股动脉搏动消失
- D. 瞳孔突然散大

E. 面色苍白

25. 诊断高血压依据的血压值的测量方法为

- A. 未用降压药的情况下，3 次或 3 次以上非同日血压值的均值
- B. 未用降压药的情况下，2 次或 2 次以上同日血压值的均值
- C. 用降压药的情况下，2 次或 2 次以上非同日血压值的均值
- D. 用降压药的情况下，2 次或 2 次以上同日血压值的均值
- E. 休息 5 分钟后测定的血压值

26. 下列不属于冠心病发病危险因素的是

- A. 饮酒
- B. 低密度脂蛋白增高
- C. 吸烟
- D. 高密度脂蛋白降低
- E. 收缩压升高

27. 下列临床表现中最不支持心绞痛诊断的是

- A. 疼痛易被运动或情绪激动诱发
- B. 含服硝酸甘油，疼痛在 3~5 分钟内缓解
- C. 疼痛可在睡眠中发生
- D. 反复出现的局限性心前区刺痛，每次持续仅 2~3 秒
- E. 疼痛在休息时发生，持续 1~10 分钟

28. 评价冠状动脉狭窄程度最可靠的检查是

- A. 放射性核素检查
- B. 心电图检查
- C. 冠状动脉造影
- D. 运动负荷试验
- E. 动态心电图

29. 有关感染性心内膜炎的临床表现，错误的是

- A. 可伴有脾大
- B. 早期易出现严重贫血
- C. 可有低热
- D. 心脏杂音性质可变
- E. 皮肤黏膜可出现瘀点

30. 下列有关慢性阻塞性肺疾病急性发作最常见的原因是

- A. 接触过敏原
- B. 接触香烟烟雾
- C. 气候变化
- D. 空气污染
- E. 感染

31. 支气管哮喘最有意义的临床表现特点是

- A. 有肺气肿体征
- B. 有哮鸣音

- C.呈进行性加重
D.呈发作性，可缓解
E.呈反复发作，持续不能缓解
- 32.对明确支气管扩张咯血患者出血部位，最有价值的检查是
A.胸部 X 线片
B.胸部 CT
C.肺动脉造影
D.支气管镜
E.支气管动脉造影
- 33.医院获得性肺炎中，病原体进入肺组织引发肺炎最主要的途径是
A.血源性播散
B.胃食管反流物误吸
C.污染空气吸入
D.口咽分泌物吸入
E.飞沫（气溶胶）吸入
- 34.判断肺结核传染性最主要的依据是
A.血沉增快
B.胸部 X 线片显示空洞性病变
C.结核菌素试验阳性
D.痰涂片找到抗酸杆菌
E.反复痰中带血
- 35.肺癌普查首选的检查方法是
A.支气管镜
B.胸部 CT
C.B 超
D.胸部 X 线
E.肿瘤标志物检测
- 36.可以鉴别上、下尿路感染的依据是
A.尿中脓细胞检查
B.尿抗体包裹细菌检查
C.尿细菌定量
D.3 小时尿白细胞计数
E.中段尿细菌培养
- 37.肾结核最具有特征性的临床表现是
A.慢性膀胱刺激症状
B.发热伴盗汗
C.腰痛
D.肉眼血尿
E.蛋白尿
- 38.对于难以鉴别的肾癌和肾囊肿，最可靠的检查方法是
A.MRI
B.逆行肾盂造影
C.B 超
D.肾动脉造影
E.X 线
- 39.水痘最常见的并发症为
A.败血症
B.肺炎
C.脑炎
D.心肌炎
E.皮肤继发细菌感染
- 40.甲状腺大部切除后 48 小时内，需注意最危急的并发症为
A.甲状腺危象
B.喉返神经单侧损伤
C.呼吸困难和窒息
D.喉上神经内侧支损伤
E.手足抽搐
- 41.有助于确定新生儿缺氧缺血性脑病损害严重程度和判断预后的检查首选
A.脑氢质子磁共振波谱
B.头颅 CT
C.头颅 MRI
D.脑电图
E.颅脑超声检查
- 42.缺铁性贫血的实验室检查结果应是
A.血清铁降低、总铁结合力降低、转铁蛋白饱和度降低
B.血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低
C.血清铁降低、总铁结合力正常、转铁蛋白饱和度降低
D.血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度正常
E.血清铁正常、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低
- 43.慢性粒细胞性白血病的实验室检查特点是
A.Ph 染色体阳性
B.中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高
C.骨髓细胞内可见 Auer 小体
D.糖原染色阳性
E.非特异性酯酶染色阳性，可被 NAF 抑制
- 44.以下颅内压增高的常见原因不包括
A.颅骨缺损
B.脑水肿
C.梗阻性脑积水
D.硬膜外血肿

E.脑肿瘤

45.遗忘综合征的三大特征是

A.近记忆障碍、虚构、定向障碍

B.谵妄、近记忆障碍、虚构

C.谵妄、虚构、定向障碍

D.幻觉、虚构、定向障碍

E.近记忆障碍、幻觉、定向障碍

46.对妊娠早期心脏病孕妇能否继续妊娠，最主要的判定依据是

A.心脏病种类

B.胎儿大小

C.病变部位

D.孕妇年龄

E.心功能分级

47.初产妇第一产程活跃期停滞是指进入活跃期后宫口不再扩张超过

A.1小时

B.1小时30分

C.2小时

D.3小时

E.4小时

48.产褥病率是指每日用口表测4次体温，每次间隔4小时，其中有两次体温在38℃以上，时间范围是在

A.产后24小时

B.产后24小时以后的1周内

C.产后24小时以后的10日内

D.产褥期内

E.产后24小时以后的半月内

49.不符合营养性巨幼红细胞性贫血临床表现的是

A.毛发稀疏、发黄

B.头围增大

C.肝、脾肿大

D.震颤

E.舌炎

50.轮状病毒肠炎容易出现的并发症是

A.肠穿孔

B.败血症

C.高钠血症

D.中毒性脑病

E.脱水，酸中毒

51.决定法洛四联症临床严重程度及预后的主要因素是

A.主动脉骑跨

B.右心室肥大

C.室间隔缺损

D.肺动脉狭窄

E.主动脉狭窄

52.关于小儿年龄分期，错误的是

A.婴儿期是指自出生28天后到满1周岁前

B.胎儿期是指从受精卵开始到胎儿出生为止

C.学龄前期是指自3周岁到6~7周岁入小学

D.新生儿期是指自胎儿出生脐带结扎到满28天

E.幼儿期是指自1周岁后到3周岁前

53.婴儿期计划免疫，正确的接种时间是

A.脊髓灰质炎疫苗2个月以上

B.卡介苗2~3个月

C.麻疹疫苗4~5个月

D.百白破疫苗6~8个月

E.乙型脑炎疫苗9~10个月

54.婴儿总热量分配不包括

A.基础代谢

B.生长发育

C.食物特殊动力作用

D.思维活动

E.排泄损失

55.早产儿的胎龄应是

A.>25周至<37足周

B.>26周至<37足周

C.>27周至<38足周

D.≥28周至<37足周

E.≥28周至<38足周

56.胃食管反流病的治疗措施不包括

A.应用促胃肠动力药

B.抗酸治疗

C.高脂肪饮食

D.减肥

E.避免饮用咖啡和浓茶

57.十二指肠后壁溃疡最常发生的并发症是

A.穿孔

B.幽门梗阻

C.胆囊炎

D.胰腺炎

E.出血

58.胃溃疡外科手术的适应证是

A.治愈后短期复发

B.周期性发作

C.年龄小于45岁

D.溃疡直径小于1cm

E.幽门螺杆菌反复感染

59.肝硬化大量腹水不会出现的腹部体征是

A.腹部膨隆

2019 年临床执业助理真题

- B.液波震颤阳性
C.尺偏试验阳性
D.移动性浊音阳性
E.蛙状腹
- 60.乳腺癌扩大根治术的切除范围是
A.乳房及同侧腋窝脂肪淋巴组织
B.乳房、胸大肌、胸小肌及其筋膜
C.乳房、胸大肌、胸小肌及同侧腋窝、锁骨上脂肪淋巴组织
D.乳房、胸大肌、胸小肌及同侧腋窝脂肪淋巴组织
E.乳房、胸大肌、胸小肌及同侧腋窝、胸骨旁脂肪淋巴组织
- 61.早期新生儿是指
A.出生后 1~3 天
B.出生后 1~5 天
C.出生后 1~7 天
D.生后 1~10 天
E.出生后 1~15 天
- 62.与冠心病发病关系最密切的血脂异常是
A.胆固醇升高
B.甘油三酯升高
C.血清高密度脂蛋白降低
D.血清低密度脂蛋白升高
E.血清极低密度脂蛋白升高
- 63.支气管哮喘的典型临床表现是
A.夜间阵发性呼吸困难
B.吸气性呼吸困难
C.发作性呼吸困难
D.混合性呼吸困难
E.劳力性呼吸困难
- 64.患者，男，40 岁。常年大量饮酒，近日出现眼球震颤、眼球不能外展和明显的意识障碍，伴定向障碍、记忆障碍、震颤训妄。该患者为
A.相关性幻觉症
B.Wernicke 脑病
C.遗感综合征
D.相关性妄想综合征
E.酒精性痴呆
- 65.男 65 岁，急性前壁心肌梗死，预防再梗和猝死，如无禁忌证，尽早使用
A.美托洛尔
B.硝苯地平
C.地高辛
D.阿托品
E.美西律
- 66.医生问病人为什么住院了，病人答道：“我有 2 个孩子，红桃代表我的心，你放开手，是计算机病毒保养自己等”，这属于什么症状
A.思维奔逸
B.病理性赘述
C.刻板言语
D.持续言语
E.思维破裂
- 67.患者回答问题简单，词穷句短，对一般询问往往无明确应答性反应，或仅简单的答以“不知道”、“没什么”，该患者的症状为
A.思维迟缓
B.思维贫乏
C.思维中断
D.思维破裂
E.病理性赘述
- 68.女，31 岁，结婚 5 年未孕，月经规律。妇科检查：子宫正常大，双侧附件正常。男方精液检查正常。本例应首先进行
A.阴道脱落细胞学检查
B.输卵管通畅检查
C.宫颈黏液结晶
D.子宫内膜病理检查
E.子宫输卵管造影
- 69.女，31 岁，自诉右乳肿块 3 个月余，手术中切除活检，见肿瘤剖面较多乳腺导管的断端有黄白色膏样物质溢出，显微镜下：癌细胞分布于乳腺导管内，未突破基底膜，并有坏死物质积聚于乳腺导管内，病理诊断应是
A.乳腺浸润性小叶癌
B.湿疹样乳腺癌
C.乳腺粉刺癌
D.乳腺黏液癌
E.乳腺浸润性导管癌
- 70.某幼儿园有，300 名儿童，近一周内有 50 名儿童相继出现发热，手心、脚心出疹子，口腔有溃疡等症状，经诊断均为手足口病，提示该病流行强度为
A.聚集
B.散发
C.流行
D.大流行
E.暴发
- 71.婚前医学检查者，对确诊患有严重遗传病不宜生育者，正确的处理方法是
A.可以结婚，但需要采取长效避孕措施或者实施结

扎手术

B.可以结婚,但需提交书面声明,保证不生育

C.不能结婚

D.可以结婚,但必须符合晚婚规定

E.《婚姻法》未明确规定禁止结婚的,可以结婚

72.某县药品监督管理部门接到某药店将保健食品作为药品出售给患者的举报后,立即对该药店进行了查处,并依照《药品管理法》的规定,将其销售给患者的保健食品认定为

A.按劣药论处的药

B.假药

C.食品

D.劣药

E.按假药论处的药

73.女,24岁。1年来反复双下肢紫癜,月经过多,病前无服药史。肝脾不大,血红蛋白100g/L,白细胞 $5.4 \times 10^9/L$,血小板 $5 \times 10^9/L$,骨髓增生活跃,巨核细胞200个,产板型巨核细胞减少。对该患者不适宜的治疗是

A.首选糖皮质激素

B.反复输注浓缩血小板

C.应用激素6个月无效可行脾切除

D.如患者应用激素无效,可加用长春新碱

E.如患者妊娠,可采用大剂量丙种球蛋白

74.男性,69岁,因持续性胸痛8小时入院。查体:双肺底有少量湿啰音,诊断为急性心肌梗死,该患者心功能分级为

A.NYHA 分级 I 级

B.NYHA 分级 IV 级

C.NYHA 分级 II 级

D.Killip 分级 II 级

E.Killip 分级 III 级

75.女,76岁,持续性胸痛,6小时来诊,既往糖尿病病史,5年,心电图示, $V_1 \sim V_6$ 导联ST段抬高0.2mV,实验室检查:血清肌钙蛋白升高,该患者心电图ST段抬高的最可能原因是

A.急性心肌梗死

B.变异型心绞痛

C.室壁瘤

D.稳定型心绞痛

E.急性心包炎

76.男,61岁,因吞咽、饮水困难,3周,现有乏力、尿少、极度口渴来诊。查体:血压正常,唇干,眼窝凹陷,烦躁不安,出现躁狂、幻觉,有时昏迷,该患者应考虑为

A.中度等渗性缺水

B.重度等渗性缺水

C.重度高渗性缺水

D.中度低渗性缺水

E.中度高渗性缺水

77.初孕妇,26岁,妊娠38周。头痛7天,今晨喷射性呕吐1次,1小时前突然抽搐并随即昏迷入院。查体:BP180/120mmHg。尿蛋白(+++)。该患者最可能的诊断是

A.子痫

B.脑出血

C.癔症

D.癫痫

E.脑血栓形成

78.女,28岁,经产妇。曾足月分娩2次。月经周期正常,经量中等。查阴道前后壁明显膨出,重度颗粒型宫颈糜烂,宫口松,子宫后倾,正常大,附件未见异常。患者要求避孕,最合适的避孕方法是

A.口服短效避孕药

B.阴茎套避孕

C.外用避孕药

D.宫内节育器

E.安全期避孕

79.女,40岁,因阴部有块物脱出就诊。妇科检查见部分宫体与宫颈外露于阴道口,宫颈较长。本例正确处理应是

A.阴道前后壁修补术

B.Manchester 手术

C.阴道纵隔形成术

D.经腹子宫全切除术

E.阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术

80.女,46岁。 G_2P_2 ,继发性痛经7年。查体:子宫如妊娠13周大小,质硬,活动受限。药物治疗后症状无缓解。最佳手术治疗方案是

A.子宫切除术

B.广泛性子宫切除术

C.改良广泛性子宫切除术

D.子宫切除加双附件切除术

E.骶神经切断术

81.女,53岁。月经稀发2年,停经6个月。近3个月来有潮热,汗多,入睡困难。B超发现左卵巢囊肿,直径4cm。子宫内膜活检病理结果显示:子宫内膜息肉。引起患者不适的原因是

A.左卵巢囊肿

B.绝经综合征

C.神经官能症

D.子宫内膜息肉

2019 年临床执业助理真题

E. 月经失调

82. 33 岁，已婚妇女。闭经半年。查子宫稍小。肌注黄体酮 20mg 连用 3 日，未见撤药性流血。再给予己烯雌酚 1mg 连服 20 日后 3 天加用安宫黄体酮 10mg，出现撤药性流血。本例应诊断为

- A. 子宫性闭经
- B. 第 I 度闭经
- C. 第 II 度闭经
- D. 垂体性闭经
- E. 下丘脑性闭经

83. 初孕妇，36 岁。妊娠 23 周，合并子宫肌壁间肌瘤，剧烈腹痛 1 天，无阴道流血。查体：T38.2℃。血常规：WBC $10 \times 10^9/L$ ，N 0.75。最可能的诊断是

- A. 子宫肌瘤囊性变
- B. 子宫肌瘤蒂扭转
- C. 子宫肌瘤合并急性阑尾炎
- D. 子宫肌瘤合并感染
- E. 子宫肌瘤红色样变

84. 女，30 岁。结婚 6 年未孕，月经规律，周期 22 天，经期 5~6 天，无痛经。基础体温为双相型，高温相为 8 天。月经来潮后 6 小时子宫内膜活检，病理检查结果最可能是

- A. 子宫内膜单纯性增生
- B. 萎缩型子宫内膜
- C. 分泌期子宫内膜腺体分泌不良
- D. 分泌期与增殖期内膜并存
- E. 增殖期子宫内膜

85. 女，30 岁。停经 12 周，阴道不规则流血 3 天，下腹隐痛。妇科检查：宫底平脐，质软，未触及胎体，未闻及胎心。尿妊娠试验阳性。应首先考虑的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 稽留流产
- C. 死胎
- D. 羊水过多
- E. 葡萄胎

86. 3 岁男孩，面色苍黄 1 个月，易疲乏，食欲减退。体检：肝肋下 3cm，质中，脾肋下 1.5cm。血常规：Hb 83g/L，RBC $2.28 \times 10^{12}/L$ ，MCV97fl，MCH36pg，MCHC36%。最可能的诊断是

- A. 溶血性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 感染性贫血

87. 女，2 岁。面色苍白 2 个月，易疲乏，时而烦躁，纳差。体检：肝肋下 3cm，质中，脾肋下 1.5cm。查血常规：Hb86g/L，RBC $3.45 \times 10^{12}/L$ ，MCV68fl，MCH20pg，MCHC0.26。最可能的诊断是

- A. 叶酸缺乏性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. VitB₁₂ 缺乏性贫血
- E. 生理性贫血

88. 男，22 天，面色苍白 7 天就诊，血常规：Hb43g/L。该患者属于

- A. 中度贫血
- B. 极重度贫血
- C. 重度贫血
- D. 正常
- E. 轻度贫血

89. 女，10 岁。尿少、水肿 2 天。体检：眼睑部水肿，血压 140/100mmHg，尿蛋白 (+)，尿红细胞 (++++)。该患儿诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 泌尿系感染
- C. 单纯性肾病
- D. 肾炎性肾病
- E. 继发性肾病

90. 女婴，8 个月。发热、呕吐、腹泻、少尿 2 天。查体：哭无泪，眼窝、前囟明显凹陷，皮肤弹性差，呈花纹状，心音低钝，四肢末梢凉。实验室检查：粪常规未见红细胞、白细胞，可见脂肪滴，血清钠 135mmol/L。患儿的脱水程度属于

- A. 中度等渗性脱水
- B. 中度高渗性脱水
- C. 重度低渗性脱水
- D. 重度等渗性脱水
- E. 中度低渗性脱水

91. 男孩，3 岁，自幼体弱，多次患肺炎。胸部 X 线片：左心房，左心室增大，肺野充血，主动脉影增宽。最可能的诊断是

- A. 艾森门格综合征
- B. 法洛四联症
- C. 动脉导管未闭
- D. 房间隔缺损
- E. 室间隔缺损

92. 女孩，3 岁。咳嗽 4 个月，痰不多，常于夜间咳醒，活动后加重，无发热，使用抗生素无明显好

转。既往有湿疹史。查体：T36.7℃。P100次/分，R20次/分，双肺呼吸音粗，未闻及干湿性啰音，腹软，无压痛。最有价值的诊断是

- A.喘息性支气管炎
- B.支气管肺炎
- C.咳嗽变异型哮喘
- D.支气管异物
- E.支气管炎

93.男孩，10个月。多汗，烦躁，睡眠不安，可见肋膈沟，下肢轻度“O”形腿。血清钙稍低，血磷降低，碱性磷酸酶增高。其佝偻病应处于

- A.前驱期
- B.初期
- C.激期
- D.恢复期
- E.后遗症期

94.女孩，10个月。间断抽搐2天，不伴发热，无咳嗽。查体：方颅，心肺无异常。查血糖3.3mmol/L，血钙1.5mmol/L，血镁0.64mmol/L，血磷2.5mmol/L。最可能的诊断是

- A.低血糖症
- B.低镁血症
- C.婴儿痉挛症
- D.维生素D缺乏性佝偻病
- E.维生素D缺乏性手足抽搦症

95.新生儿，出生时身体红，四肢青紫，呼吸24次/分，不规则，心率80次/分，四肢能活动，弹足底有皱眉反应。最可能的诊断是

- A.新生儿轻度缺氧缺血性脑病
- B.新生儿中度缺氧缺血性脑病
- C.新生儿重度缺氧缺血性脑病
- D.新生儿重度窒息
- E.新生儿轻度窒息

96.女婴，出生30小时。出现嗜睡伴肌张力低下，初步诊断为缺氧缺血性脑病。为了解患儿丘脑、基底节有无病灶，应首选的检查是

- A.头颅CT
- B.脑电图
- C.颅脑透照试验
- D.B超
- E.头颅MRI

97.男，5天，昨起拒食，反应差，今日皮肤明显黄染而入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，分泌物涂片找到G⁺球菌，心肺无异常，肝右肋下2.5cm，脾肋下1cm。最可能的诊断是

- A.新生儿肺炎

- B.新生儿败血症
- C.新生儿颅内出血
- D.新生儿核黄疸
- E.新生儿寒冷损伤综合征

98.某患者十二指肠球部溃疡病史7年，突发剧烈上腹痛，迅速波及全腹。查体：板状腹，全腹压痛，反跳痛。肌紧张，高度怀疑球部溃疡合并穿孔，此时最不能考虑的检查为

- A.急性胃镜
- B.饮水超声
- C.X线钡餐
- D.立位腹平片
- E.吞线试验

99.初孕妇，27岁。妊娠36周，自觉头痛、视物模糊3周，晨起突然出现持续性腹痛且逐渐加重。腹部检查：子宫板状硬。该患者最可能的诊断是

- A.先兆早产
- B.胎盘早剥
- C.急性阑尾炎
- D.前置胎盘
- E.先兆子宫破裂

100.初孕妇，妊娠37周，夜间睡眠中突然出现阴道大量流血，无阵发性腹痛。查体：重度贫血貌，P110次/分，BP80/60mmHg。妇科检查：子宫软，枕左前位，胎心率166次/分。此时最佳的处理措施是

- A.立即行B超检查
- B.输血同时行人工破膜
- C.立即输血纠正休克
- D.输血同时行剖宫产术
- E.立即行无应激试验

101.女，31岁。间断上腹隐痛4年，疼痛无规律，多餐后发生，无反酸、烧心、消瘦。查体：心肺无异常，腹部无压痛，未触及包块，肝脾肋下未触及。腹部B超未见异常。最有可能的诊断是：

- A.慢性胆囊炎
- B.慢性阑尾炎
- C.慢性胃炎
- D.慢性胰腺炎
- E.胃食管反流病

102.初产妇，28岁。孕足月临产后静脉滴注缩宫素，自然破膜1分钟后出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀，数分钟后死亡。该患者最可能的诊断是

- A.子宫破裂
- B.重度胎盘早剥

2019 年临床执业助理真题

C.重度子痫前期

D.子痫

E.羊水栓塞

103.男, 50 岁。咳嗽、咳痰 30 年, 加重伴气短、下肢水肿、尿少 1 个月。使用呋塞米出现手足抽搦的原因是

A.低钠血症

B.代谢性碱中毒

C.代谢性酸中毒

D.高钙血症

E.低镁血症

104.男, 27 岁。少尿、水肿 2 月余, 6 岁时曾发现尿蛋白阳性。血压 170/110mmHg, 尿蛋白(-)、红细胞 6~10/HP、白细胞 2~5/HP、BUN16mmol/L、血肌酐 63mmol/L、血红蛋白 75g/L。初步诊断为

A.急性肾小球肾炎

B.慢性肾小球肾炎

C.肾病综合征

D.慢性肾盂肾炎, 肾功能不全

E.高血压肾病, 肾功能不全

105.男, 45 岁。地震中受挤压 10 小时后获救, 出现酱油色尿。查体: BP105/60mmHg, 左下肢肿胀、压痛。尿隐血(++++), 尿沉渣镜检 RBC0~2/HP。Scr280umol/L, K⁺6.5mmol/L。首要的急救治疗是

A.大量补液

B.利尿

C.血液透析

D.抗感染

E.肿胀患肢切开减压

106.男, 32 岁, 后背及双上臂沸水烫伤 4 小时, 查体: T37.4℃, P100 次/分, R20 次/分,

BP130/90mmHg, 意识清楚, 后背及双上臂背侧红肿明显, 大量水疱, 基底发红, 疼痛明显。该患者皮肤烧成的深度和分度

A.浅 II°中度烧伤

B.深 II°轻度烧伤

C.深 II°重度烧伤

D.浅 II°轻度烧伤

E.深 II°中度烧伤

107.女, 33 岁。因误服有机磷农药半小时, 意识障碍逐渐加重入院。经洗胃、导泻、应用阿托品、氯解磷定、对症支持等治疗后意识恢复, 症状好转。2 天后患者突然出现视物模糊、面瘫、呼吸困难, 并再次出现意识障碍, 大小便失禁。查体: T36.8℃, P67 次/分, R14 次/分, BP125/80mmHg, 肌力 3

级。SpO₂ 93%。目前出现的情况最可能的原因是

A.急性脑卒中

B.有机磷中毒加重

C.急性有机磷中毒迟发型脑病

D.中间型综合征

E.急性有机磷中毒迟发型多发性神经病变

108.女, 43 岁。左乳房外上象限扪及 3cm×5cm 质硬肿块, 与皮肤和肌肉无界限, 左腋窝扪及肿大孤立的质硬淋巴结。活检穿刺细胞学检查见癌细胞, 余未见异常。该患者按乳腺癌患者 TNM 分期是

A.T₃N₁M₀。

B.T₄N₁M₀。

C.T₂N₁M₀

D.T₂N₂M₀

E.T₁N₁M₀

109.女, 20 岁, 双下肢水肿伴口腔溃疡半年。24 小时尿蛋白定量 4g, ANA1:320 抗 dsDNA 抗体阳性。最可能的诊断是

A.原发性肾小球肾炎

B.系统性血管炎

C.干燥综合征

D.系统性硬化病

E.系统性红斑狼疮

110.男孩, 6 岁。突发寒战, 高热, 1 天后全身出现多处紫斑。查体: 血压 70/50mmHg, 脉搏 120 次/分, 面色苍白, 皮肤发花, 多处皮肤瘀斑, 颈软, 心肺无异常, 克氏征(±)。实验室检查: 外周血 WBC28×10⁹/L, 中性粒细胞 90%, 血小板 60×10⁹/L。最可能的诊断是

A.血小板减少性紫癜

B.暴发型流行性脑脊髓膜炎

C.败血症休克

D.中毒型菌痢

E.休克型肺炎

111.男, 40 岁。乏力、反复牙龈出血及皮肤出血点 1 年。乙型肝炎病史 10 余年。查体: 左肋下可触及包块, 边界清, 质地韧, 有切迹, 随呼吸移动, 无压痛。该包块可能是

A.左肾

B.胰腺癌

C.脾脏

D.胃癌

E.肝脏左叶

112.学生, 19 岁。右股骨下端疼痛 1 个月, 夜间尤甚。查体: 右股骨下端偏内侧局限性隆起, 皮温略

高，皮肤浅静脉怒张，明显压痛，膝关节运动受限。X线片示右股骨下端干骺端溶骨性骨破坏，边界不清，可见Codman三角。诊断为

- A. 软骨肉瘤
- B. 骨纤维肉瘤
- C. 骨肉瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 尤因肉瘤

113. 女，36岁。因患子宫肌瘤在县医院接受手术治疗，术后患者因对手术效果不满意诉至法院。法院经审理认为医院存在《侵权责任法》规定的过错推定情形，判决医院败诉。该推定的情形是

- A. 未尽到说明义务
- B. 未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务
- C. 伪造病历资料
- D. 泄露患者隐私
- E. 限于当时的医疗水平难以诊疗

114. 女，38岁。突发上腹剧痛5天，加重伴发热3天，查体：T38.5℃，BP76/50mmHg，面色苍白。嗜

睡，脉搏细速，尿少，中上腹压痛(+)，伴反跳痛，上腹部可触及肿块，不活动。B超示胰腺周围液性包块，直径10cm。尿淀粉酶

10000SomogyiU/L，血WBC $18 \times 10^9/L$ ，引起该患者感染的致病菌最可能的是

- A. 肠球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 结核杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 白色念珠菌

115. 男，30岁。尿频尿急尿痛3天。尿常规：尿比重1.017，RBC0~3/HP。WBC6~10/HP。静脉肾盂造影未见异常，首先考虑的治疗是

- A. 口服喹诺酮类5天
- B. 口服喹诺酮类3天
- C. 口服喹诺酮类7天
- D. 静脉氨苄青霉素7天
- E. 静脉青霉素联合红霉素3天

A3/A4 型选择题

(116~118题共用题干)

女孩，6岁。发热2个月，心悸1个月。并左膝关节痛，双肘、腕关节红肿，偶有胸闷，口服抗生素疗效不佳。查体：T38.2℃，心率134次/分，第一心音减弱，心尖区可闻及吹风样收缩期杂音，偶可闻及早搏，左膝、双肘、腕关节红肿，有触痛。实验室检查：血WBC $12 \times 10^9/L$ ，N0.8，ESR40mm/h，血ASO增高。心电图示一度房室传导阻滞，ST段下移，T波平坦。

116. 最可能的诊断是

- A. 风湿热
- B. 结核性关节炎
- C. 幼年特发性关节炎
- D. 化脓性关节炎
- E. 风湿性心脏瓣膜病

117. 该患儿需绝对卧床休息的时间是：

- A. 4周
- B. 2周
- C. 6周
- D. 5周
- E. 3周

118. 若患儿出现心力衰竭，首选的治疗药物是：

- A. 洋地黄
- B. 酚妥拉明

- C. 呋塞米
- D. 甲泼尼龙
- E. 阿司匹林

(119~121题共用题干)

女，30岁，哺乳期。左乳房胀痛、发热2天。查体：T39.4℃，P106次/分。左乳房外上象限6cm×4cm范围红肿，有明显压痛和波动感。急行切开引流术。

119. 错误的手术措施是

- A. 脓腔最低处引流
- B. 切开后用手指探入脓腔内隔膜
- C. 行对口引流
- D. 切开扩张的乳腺导管充分引流
- E. 按轮辐方向做切口

120. 术后抗感染治疗针对的主要致病菌是

- A. 白色葡萄球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 腐生葡萄球菌
- E. 溶血性链球菌

121. 该患者经治疗后康复，避免再次发生的预防措施不包括

- A. 注意婴儿口腔卫生
- B. 防止乳头损伤

- C.预防性应用抗生素
- D.养成定时哺乳习惯
- E.避免乳汁淤积

(122~124 题共用题干)

男, 60 岁。粘连性肠梗阻 5 天, 出现呼吸深快。查体: 面部潮红, 心率 110 次/分, 血压 90/60mmHg, 腱反射减弱。实验室检查: 血 pH7.20, 血浆 HCO_3^- 15mmol/L。

122. 该患者酸碱失衡诊断为
- A.呼吸性酸中毒
 - B.代谢性酸中毒
 - C.呼吸性碱中毒
 - D.代谢性碱中毒
 - E.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

123. 首选的治疗措施是

- A.辅助呼吸, 加速 CO_2 排出
- B.静脉滴注生理盐水
- C.静脉滴注 5% 碳酸氢钠
- D.快速静脉注射高渗糖水
- E.静脉滴注 5% 葡萄糖盐水

124. 如果输液后, 患者出现手足抽搐, 应立即静脉注射

- A.5% 碳酸氢钠
- B.地西泮
- C.硫喷妥钠
- D.5% 葡萄糖盐水
- E.10% 葡萄糖酸钙

(125~127 题共用题干)

男, 30 岁。从 3 楼跌下左腹部跌伤, 左 6、7、8 肋骨骨折, 脾破裂, 肠破裂。入院时精神紧张, 体温 38.5°C , 面色苍白, 肢端冰冷, 脉搏细速, 心率 110 次/分, 血压 130/100mmHg, 尿量减少。

125. 该患者的休克状态应属于

- A.休克前期
- B.中度休克
- C.重度休克

- D.暖休克
- E.冷休克

126. 目前不宜立即进行的检查是

- A.血常规
- B.腹腔穿刺
- C.静脉肾盂造影
- D.中心静脉压测定
- E.二氧化碳结合力测定

127. 首先考虑的治疗措施为

- A.静脉输注血管收缩药物
- B.立即剖腹探查
- C.迅速补充血容量
- D.大剂量应用抗生素
- E.静脉滴注利尿剂改善肾功能

(128~130 题共用题干)

男, 56 岁。心房颤动患者, 突然发生生命危险。2 周来共发生过 5 次, 每次持续 2~15 秒。查体无神经系统异常。脑 CT 无异常。

128. 可能的诊断是

- A.脑动脉瘤
- B.脑血栓形成
- C.脑出血
- D.脑血管畸形
- E.短暂性脑缺血发作

129. 主要累及的血管是

- A.基底动脉系
- B.椎动脉系
- C.颈内动脉系
- D.大脑后动脉
- E.大脑前动脉

130. 最适宜的预防治疗药物是

- A.阿司匹林
- B.华法林
- C.丙戊酸钠
- D.胞二磷胆碱
- E.降纤酶

B1 型选择题

(131~132 题共用备选答案)

- A.AFP<20ug/L
- B.AFP>100ug/L
- C.AFP>200ug/L, 持续 6 周
- D.AFP>200ug/L, 持续 8 周
- E.AFP>500ug/L, 持续 2 周

131. 诊断肝细胞癌的依据是

132. 诊断胆管细胞癌的依据是

(133~134 题共用备选答案)

- A.低增生性白血病
- B.骨髓增生异常综合征
- C.假性粒细胞减少

- D.Felty 综合征
E.巨幼细胞贫血
- 133.由免疫机制引起中性粒细胞减少的疾病是
134.由分布异常引起中性粒细胞减少的疾病是
(135~136 题共用备选答案)
- A.肩关节前脱位
B.肘关节后脱位
C.膝关节脱位
D.腕关节脱位
E.髋关节脱位
- 135.Hippocrates 法治疗的是
136.Allis 法治疗的是
(137~138 题共用备选答案)
- A.胎儿缺氧
B.宫缩时胎头受压
C.胎儿受镇静药物影响
D.胎儿状况良好
E.宫缩时脐带受压兴奋迷走神经
- 137.胎心减速出现在宫缩高峰后,下降慢,持续时间长,恢复慢。提示
138.胎心减速与宫缩无固定关系,下降迅速且下降幅度大,恢复也迅速。提示
(139~140 题共用备选答案)
- A.腺病毒
B.带状疱疹病毒
C.柯萨奇病毒
D.呼吸道合胞病毒
E.人类疱疹病毒 6 型
- 139.幼儿急疹的病原体是
140.疱疹性咽峡炎的病原体是
(141~142 题共用备选答案)
- A.代谢性酸中毒
B.代谢性碱中毒
C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性碱中毒
E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒
- 141.肠痿可出现的酸碱平衡紊乱为
142.肝硬化大量腹腔积液患者长期使用呋塞米,可

- 能出现的酸碱平衡失调是
(143~144 题共用备选答案)
- A.过敏性紫癜
B.单纯性紫癜
C.血友病
D.特发性血小板减少性紫癜
E.血栓性血小板减少性紫癜
- 143.紫癜伴腹痛、关节痛和肾脏病变的疾病是
144.骨髓检查巨核细胞增多伴产板型巨核细减少的疾病是
(145~146 题共用备选答案)
- A.左心房心室扩大,收缩期心尖部向外突出
B.胸部 X 片示心影轮廓呈烧瓶状
C.左心室舒张末期内径 6cm,射血分数 35%
D.室间隔厚度 1.1cm,左心室后壁厚度 0.9cm
E.左心室流出道压力阶差 40mmHg
- 145.符合扩张型心肌病表现的是
146.符合肥厚型梗阻性心肌病表现的是
(147~148 题共用备选答案)
- A.思维化声
B.思维插入
C.思维散漫
D.思维缺乏
E.思维异常
- 147.患者在思考时体验到自己的思想同时变成了言语声,自己和他人都能听到,患者体验到的这种声音来自外界。属于
148.患者正在工作,脑中突然显现出别的思想。属于
(149~150 题共用备选答案)
- A.乳酸酸中毒
B.水肿
C.胃肠道反应
D.皮肤过敏
E.低血糖
- 149.双胍类药物较严重的不良反应是
150.磺酰脲类药物较严重的不良反应是