

# 第一单元

1. **答案:** D **考点:** 阴阳互根(2017)。**解析:** 阴阳互根,是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面,具有相互依存,互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在,每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。阴阳互用,是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。
2. **答案:** A **考点:** 五行的概念及其特性(2017)。**解析:** 水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穡。
3. **答案:** A **考点:** 五行母子相及(2017)。**解析:** 木生火,木病及火,属母病及子。
4. **答案:** B **考点:** 五行相生(2017)。**解析:** 相生规律:培土生金、滋水涵木、金火相生、益火补土;相克规律:抑木扶土、培土制水、佐金平木、泻南补北。
5. **答案:** A **考点:** 心与肾(2017)。**解析:** 心属火,肾属水,心与肾水火共济。
6. **答案:** E **考点:** 事物属性的五行归类(2017)。**解析:** 略。
7. **答案:** B **考点:** 脾与胃(2017)。**解析:** 略。
8. **答案:** B **考点:** 生气化神(2017)。**解析:** 精化气,气化神,神御形。
9. **答案:** C **考点:** 元气的基本含义(2017)。**解析:** 元气又名原气、真气,是人体最基本、最重要的气,是人体生命活动的原动力。
10. **答案:** A **考点:** 影响体质的因素(2017)。**解析:** 体质主要取决于父母所给予的先天禀赋,先天禀赋的状况与父母生殖之精的质量密切相关。
11. **答案:** C **考点:** 五行的概念及其特性(2018)。**解析:** 水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土曰稼穡。
12. **答案:** A **考点:** 心(2018) **解析:** 略。
13. **答案:** E **考点:** 脾的生理功能(2018) **解析:** 脾主运化,脾主统血。
14. **答案:** D **考点:** 跷脉的生理功能(2018) **解析:** 跷脉主司下肢运动、眼睑开合。

15. **答案:** D **考点:** 燥邪的致病特点(2018)

**解析:** 燥性干涩,易伤津液。

16. **答案:** D **考点:** 《素问·举痛论》(2018)

**解析:** 怒则气逆,甚则呕血及飧泄,故气上矣。喜则气和志达,荣卫通利,故气缓矣。悲则心系急,肺布叶举,而上焦不通,荣卫不散,热气在中,故气消矣。恐则精却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气不行矣。寒则腠理闭,气不行,故气收矣。炅则腠理开,荣卫通,汗大泄,故气泄。惊则心无所依,神无所归,虑无所定,故气乱矣。劳则喘息汗出,外内皆越,故气耗矣。思则心有所存,神有所归,正气留而不行,故气结矣。

17. **答案:** E **考点:** 瘀血致病的临床特点

(2018) **解析:** ①疼痛:一般表现为刺痛,痛处固定不移,拒按,夜间痛势尤甚。②肿块:瘀血积于皮下或体内则可见肿块,肿块部位多固定不移。若在体表则可见局部青紫,肿胀隆起,所谓血肿;若在体腔内则扪之质硬,坚固难移,所谓癥积。③出血:部分瘀血为病者可见出血之象,通常出血量少而不畅,血色紫暗,或夹有瘀血块。④色紫暗:一是面色紫暗,口唇、爪甲青紫等;二是舌质紫暗,或舌有瘀斑、瘀点等。⑤可表现出肌肤甲错及脉象上的某些异常,如涩脉或结代脉等。

18. **答案:** D **考点:** 阴阳偏衰(2018) **解析:**

阳偏衰即阳虚,表现为机体阳气不足,阳不制阴,阴相对偏盛的虚寒证。

19. **答案:** C **考点:** 气逆(2018) **解析:** 气逆最常见于肺、胃和肝等脏腑。

20. **答案:** B **考点:** 真寒假热证(2018) **解析:**

真寒假热证为阴盛于内,格阳于外,其本质仍是寒证,故称“真寒假热”治疗上要用温里回阳,引火归元。

21. **答案:** B **考点:** 心血虚、心阴虚证(2016)

**解析:** 心血虚的临床表现:心悸怔忡,失眠多梦,健忘,眩晕,面色淡白或萎黄,唇舌色淡,脉细。心阴虚证的临床表现:心悸怔忡,心烦,失眠多梦,五心烦热,潮热,盗汗,颧红,舌红少苔,脉细数。

22. **答案:** A **考点:** 心火亢盛证(2016) **解析:**

心主神明,火热内炽,扰乱心神,则心

烦失眠，甚或狂躁，神昏谵语；火邪伤津，故口渴，尿黄，便结；心之华在面，开窍于舌，火热循经上炎，则面赤，口舌生疮，腐烂疼痛；热伤血络，迫血妄行，则见吐血、衄血；心热下移小肠，故小便赤、涩、灼、痛；舌尖红绛，脉数有力，为火热内盛之象。

23. **答案：C** **考点：寒滞胃肠证、食滞胃肠证、胃肠气滞证（2016）****解析：**寒滞胃肠证的临床表现：胃脘冷痛，甚则剧痛，得温痛减，遇寒加剧，恶心呕吐，吐后痛缓，或呃逆嗳气，口淡不渴或口泛清水，形寒肢冷，舌淡苔白滑，脉沉紧或弦。食滞胃肠证的临床表现：脘腹胀满疼痛，拒按，嗝腐吞酸，或呕吐酸腐食物，吐后觉舒，纳呆厌食；或肠鸣矢气，便溏不爽或便秘，舌苔厚腻，脉滑。胃肠气滞证的临床表现：胃脘腹部胀满疼痛，走窜不定，痛而欲吐或泻，泻而不爽，嗳气，肠鸣矢气，得嗳气、矢气后胀痛缓解，或无肠鸣矢气则胀痛加剧，大便秘结，苔厚，脉弦。

24. **答案：E** **考点：肾阳虚证（2016）****解析：**肾阳虚证的临床表现：腰膝酸软冷痛，畏寒肢冷，下肢尤甚，面色㿔白或黧黑，神疲乏力；或见性欲冷淡，男子阳痿、滑精、早泄，女子宫寒不孕，白带清晰量多；或大便稀溏，或五更泄泻，尿频清长，夜尿多；舌淡苔白，脉沉细迟无力，尺部尤甚。

25. **答案：A** **考点：肝胃不和证（2016）****解析：**肝胃不和证的临床表现：胃脘、胁肋胀痛或窜痛，嗳气呃逆，吞酸嘈杂，食少纳减，情志抑郁，善太息，急躁易怒，舌红苔薄黄，脉弦或弦数。

26. **答案：C** **考点：合病（2016）****解析：**两经或三经的病证同时出现者，称为合病；传经是指病邪从外侵入，逐渐向里深入，由一经病证转变为另一经病证；一经病证未罢，又出现另一经病证，称为并病，并病的两经病证合并出现，但有先后之别；凡伤寒病初起，病邪不从阳经传入，而直接侵袭三阴经而发病者，称为直中。

27. **答案：B** **考点：顺传（2013）****解析：**三焦病证的传变，一般多由上焦手太阴肺卫开始，传入中焦，进而传入下焦，此为“顺传”，标志着病情由浅入深，由轻到重的病理进程。

若病邪从肺卫而传入心包者，称为“逆传”，说明邪热炽盛，病情重笃。

28. **答案：A** **考点：中医诊断基本原理（2018）****解析：**中医诊断的基本原理：司外揣内，见微知著，以常衡变。

29. **答案：A** **考点：望姿态的内容（2018）****解析：**卧时面常向外，身轻自能转侧，多属阳证、热证、实证；卧时面常向里，身重不能转侧，多属阴证、寒证、虚证，若见于久病重病，多是气血衰败已极，预后不良。仰卧伸足，掀去衣被，多属实热证；蜷卧缩足，喜加衣被者，多属虚寒证。坐卧不安是烦躁之征，或腹满胀痛之故。

30. **答案：A** **考点：舌诊方法和注意事项（2018）****解析：**饮服某些食物或药物，会使舌苔染色，称为染苔。发现时，可询问患者，或用揩舌的方法予以鉴别。

31. **答案：C** **考点：望舌苔（2018）****解析：**略。

32. **答案：A** **考点：闻诊语言（2018）****解析：**神识清楚而语言时有错乱，语后自知为错语。虚证多由心气不足，神失所养所致；实证多由痰浊、瘀血、气郁等阻碍心神所致。

33. **答案：E** **考点：耳鸣（2018）****解析：**耳鸣有虚实之分。一般来说，凡突发耳鸣，声大如潮声，按之鸣声不减，或加重者，多属实证，常因肝胆火盛，上扰清窍或痰瘀阻滞清窍所致。若渐觉耳鸣，声小如蝉鸣，按之鸣声减轻或暂停者，多属虚证，常因肝肾阴虚，肝阳上扰，或肾精亏虚，髓海不充，耳失所养，或脾虚气陷所致。

34. **答案：D** **考点：排便感异常（2018）****解析：**肛门有下坠感，甚则脱肛，劳累或排便后加重。多属脾虚中气下陷，常见于久泻或久痢不愈的患者。

35. **答案：D** **考点：常见脉象及临床意义（2018）****解析：**洪脉脉来浮大，充实有力，如波涛汹涌，来盛去衰。实脉三部脉举按均有力。

36. **答案：C** **考点：诊小儿脉（2018）****解析：**2~3岁的，一息六七至为平脉；5~10岁的，六至为平脉，七至以上为数脉，四五至为迟脉。

37. **答案：C** **考点：虚证与实证（2018）****解**

析:实证临床表现具有“有余、亢盛、停聚”的症状特征。

38. **答案:** E **考点:** 寒证与热证(2018) **解析:** 略。

39. **答案:** C **考点:** 肝与胆病证(2018) **解析:** 肝阳上亢以眩晕耳鸣、头目胀痛、面红烦躁、腰膝酸软等上盛下虚症状共见。肝火炽盛以胁痛、头痛、烦躁、耳鸣等与实热症状共见。

40. **答案:** C **考点:** 肾与膀胱病证(2018) **解析:** 肾不纳气症见气短,气喘,动则喘甚而汗出,呼多吸少等吸气困难表现,面虚浮,脉细无力或虚浮无根。

41. **答案:** C **考点:** 《伤寒论》(2018) **解析:** 伤寒八九日,下之,胸满烦惊,小便不利,谵语,一身尽重,不可转侧者,柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

42. **答案:** A **考点:** 三焦病证(2018) **解析:** “中焦燥热”以身热神昏、腹满便秘、苔黄燥、脉沉实等为辨证要点;“中焦湿热”以身热不扬、脘痞欲呕、便溏不爽、苔黄腻、脉濡数等为辨证要点。

43. **答案:** D **考点:** 蛇床子(2017) **解析:** 蛇床子燥湿祛风,杀虫止痒。

44. **答案:** B **考点:** 温热药(2018) **解析:** 略。

45. **答案:** A **考点:** 荆芥、蝉蜕(2018) **解析:** 荆芥有解表散风,透疹,消疮功效。蝉蜕有疏散风热,利咽开音,透疹,明目退翳,息风止痉功效。

46. **答案:** E **考点:** 石膏(2018) **解析:** 石膏生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:敛疮生肌,收湿,止血。用于外感热病,高热烦渴,肺热喘咳,胃火亢盛,头痛,牙痛。凡阳虚寒证,脾胃虚弱及血虚、阴虚发热者慎用。

47. **答案:** E **考点:** 连翘(2018) **解析:** 连翘性苦,微寒。归肺、心、小肠经。清热解毒,消肿散结。用于痈疽,瘰疬,乳痈,丹毒,风热感冒,温病初起,温热入营,高热烦渴,神昏发斑,热淋尿闭。

48. **答案:** A **考点:** 甘遂、大戟(2018) **解析:** 甘遂泻水逐饮。大戟泻水逐饮,消肿散结。

49. **答案:** B **考点:** 苍术、白术(2018) **解析:** 苍术燥湿健脾,祛风散寒,明目。白术健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。

50. **答案:** C **考点:** 车前子(2018) **解析:** 车前子清热利尿通淋,渗湿止泻,明目,祛痰。用于热淋涩痛,水肿胀满,暑湿泄泻,目赤肿痛,痰热咳嗽。

51. **答案:** A **考点:** 干姜(2018) **解析:** 干姜温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,寒饮喘咳。

52. **答案:** D **考点:** 山楂(2018) **解析:** 山楂具有消食健脾,行气散瘀功效。用于肉食积滞,胃脘胀满,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,疝气作痛;高血脂症。

53. **答案:** B **考点:** 苦楝皮(2018) **解析:** 苦楝皮驱虫,疗癣。用于蛔蛭虫病,虫积腹痛;外治疥癣瘙痒。

54. **答案:** C **考点:** 益母草(2018) **解析:** 益母草活血调经,利尿消肿,清热解毒。用于月经不调,痛经经闭,恶露不尽,水肿尿少,疮疡肿毒。

55. **答案:** A **考点:** 牛膝(2018) **解析:** 牛膝苦、酸,性平。归肝、肾经。补肝肾,强筋骨,逐瘀通经,引血下行。用于腰膝酸痛,筋骨无力,经闭癥瘕,肝阳眩晕。

56. **答案:** C **考点:** 郁金、丹参(2018) **解析:** 郁金和丹参同为活血祛瘀药。郁金行气化瘀,清心解郁,利胆退黄;用于经闭痛经,胸腹胀痛、刺痛,热病神昏,癫痫发狂,黄疸尿赤。丹参祛瘀止痛,活血通经,清心除烦;用于月经不调,经闭痛经,症瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠;肝脾肿大,心绞痛。

57. **答案:** D **考点:** 桔梗(2018) **解析:** 宣肺,利咽,祛痰,排脓。用于咳嗽痰多,胸闷不畅,咽痛,音哑,肺痈吐脓,疮疡脓成不溃。

58. **答案:** A **考点:** 半夏、天南星(2018) **解析:** 半夏燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。用于痰多咳喘,痰饮眩悸,风痰眩晕,痰厥头痛,呕吐反胃,胸脘痞闷,梅核气;生用外治痈肿痰核。姜半夏多用于降逆止呕。天南星燥湿化痰,祛风止痉,散结消肿。用于顽痰咳嗽,风痰眩晕,中风痰壅,口眼歪斜,

半身不遂，癩痢，惊风，破伤风；生用外治  
痈肿，蛇虫咬伤。

59. **答案：**E **考点：**葶苈子（2018）**解析：**  
泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，喘咳  
痰多，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小  
便不利；肺原性心脏病水肿。

60. **答案：**D **考点：**血府逐瘀汤的组成药物  
（2016）**解析：**血府逐瘀汤主治胸中血瘀证，  
功用为活血化瘀，行气止痛。方中主要由桃  
仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛  
膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草组成。

61. **答案：**E **考点：**血府逐瘀汤的配伍意义  
（2014）**解析：**血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。  
本方以活血化瘀，行气止痛为法。方中桃仁  
破血行滞润燥，红花活血祛瘀止痛，共为君  
药；赤芍、川芎助君药活血祛瘀，牛膝活血  
通经，祛瘀止痛，引血下行，共为臣药；生  
地、当归养血益阴，清热活血，桔梗、枳壳，  
一升一降，宽胸行气，柴胡疏肝解郁，升达  
清阳，与桔梗、枳壳同用，尤善理气行滞，  
使气行则血行，以上均为佐药；桔梗并能载  
药上行，兼有使药之用，甘草调和诸药，亦  
为使药。

62. **答案：**D **考点：**补阳还五汤的组成药物  
（2014）**解析：**补阳还五汤主治中风之气虚  
血瘀证。功用为补气、活血、通络。方中主  
要由黄芪、当归、赤芍、地龙、川芎、红花、  
桃仁组成。

63. **答案：**A **考点：**生化汤的组成药物（2006，  
2016）**解析：**生化汤的药物组成：全当归、  
川芎、桃仁、炮姜、甘草。温经汤的药物组  
成：吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂  
枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦  
冬。血府逐瘀汤的药物组成：桃仁、红花、  
当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、  
柴胡、枳壳、甘草；通窍活血汤的药物组成：  
赤芍、川芎、桃仁、红花、老葱、鲜姜、红  
枣、麝香、黄酒；身痛逐瘀汤的药物组成：  
秦艽、川芎、桃仁、红花、甘草、羌活、没  
药、当归、五灵脂、香附、牛膝、地龙。

64. **答案：**A **考点：**咳血方的主治证候（2006，  
2016）**解析：**咳血方清火化痰，敛肺止咳，  
主治肝火犯肺，灼伤肺络。

65. **答案：**B **考点：**川芎茶调散的主治证候

（2013）**解析：**川芎茶调散的功用是疏风止  
痛，主治外感风邪头痛。症见偏正头痛，或  
巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄  
白，脉浮。

66. **答案：**C **考点：**羚角钩藤汤的主治证候  
（2014）**解析：**天麻钩藤饮主治肝阳偏亢，  
肝风上扰证，功用为平肝息风，清热活血，  
补益肝肾。大定风珠主治阴虚风动证，功用  
为滋阴息风。羚角钩藤汤主治热盛动风证，  
功用为凉肝息风，增液疏筋。镇肝熄风汤主  
治类中风，功用为镇肝熄风、滋阴潜阳。川  
芎茶调散主治外感风邪头痛，功用为疏风止  
痛。

67. **答案：**C **考点：**镇肝熄风汤的配伍意义  
（2013）**解析：**镇肝熄风汤的功用是镇肝熄  
风、滋阴潜阳。方中怀牛膝引血下行，补益  
肝肾为君；代赭石镇肝降逆，合牛膝引气血  
下行，急治其标；龙骨、牡蛎、龟板、白芍  
益阴潜阳，镇肝熄风，共为臣药。玄参、天  
冬下走肾经。滋阴清热，合龟板、白芍滋水  
以涵木，滋阴以柔肝；肝为刚脏，性喜条达  
而恶抑郁，以茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝  
热，疏肝理气，甘草调和诸药，合生麦芽能  
和胃安中，以防金石、介类药物碍胃。

68. **答案：**C **考点：**天麻钩藤饮的主治证候  
（2005，2016）**解析：**羚角钩藤汤主治肝经  
热盛，热极动风。镇肝熄风汤主治肝肾阴亏，  
肝阳上亢，气血逆乱。天麻钩藤饮主治肝阳  
偏亢，肝风上扰。大定风珠主治温病热邪久  
羁，热灼真阴。地黄饮子主治暗痲证。

69. **答案：**C **考点：**桑杏汤的主治证候（2015）  
**解析：**桑杏汤的功用是清宣温燥，润肺止咳。  
主治外感温燥证。症见身热不甚，口渴，咽  
干鼻燥，干咳无痰或少痰而黏，舌红，苔薄  
白而干，脉浮数而右脉大者。

70. **答案：**B **考点：**玉液汤的配伍意义（2014）  
**解析：**玉液汤主治消渴之气阴两虚证，以口  
渴尿多、困倦气短、脉虚细无力为主要表现，  
乃元气不升，真阴不足，故治以益气滋阴，  
固肾止渴。方中以黄芪、山药益气生津，补  
脾固肾为君；知母、天花粉滋阴清热、润燥  
止渴为臣；葛根助黄芪升发脾胃清阳，输布  
津液以止渴为佐药；鸡内金助脾健运，运化  
水谷精微，《医学衷中参西录》谓：“化饮食

中糖质为津液也。”五味子助山药补肾固精，收敛阴津以缩尿，使精微不至于下趋。

71. **答案:** E **考点:** 茵陈蒿汤的主治证候

(2014) **解析:** 龙胆泻肝汤的功用是清泻肝胆实火，清利肝胆湿热；主治肝胆实火上炎证；肝经湿热下注证。柴胡疏肝散的功用是疏肝行气，活血止痛；主治肝气郁滞证。旋覆花汤的功用是下气散结；主治消渴，腹胁虚胀，心下满闷。一贯煎的功用是滋阴疏肝；主治肝肾阴虚，肝气郁滞证。茵陈蒿汤的功用是清热利湿退黄；主治湿热黄疸。

72. **答案:** B **考点:** 三仁汤的主治证候(2016)

**解析:** 三仁汤的功用是宣畅气机、清利湿热，主治湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证。症见头痛恶寒，身重疼痛，肢体倦怠，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴，脉弦细而濡。

73. **答案:** C **考点:** 三仁汤的配伍意义(2006,

2011, 2012, 2013) **解析:** 三仁汤中杏仁宣利上焦肺气。白蔻仁宣畅中焦气机，薏苡仁渗利下焦气机，共为君药。三仁“宣上、畅中、渗下”。

74. **答案:** B **考点:** 八正散的组成药物(2013)

**解析:** 八正散的功用是清热泻火、利水通淋，主治热淋。症见尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色浑赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。组成为车前子、瞿麦、篇蓄、滑石、山栀子仁、甘草、木通、大黄、灯心。

75. **答案:** C **考点:** 八正散的主治证候(2011,

2016) **解析:** 八正散清热泻火，利水通淋。主治湿热淋证。尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色混赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

76. **答案:** C **考点:** 防己黄芪汤的组成药物

(2009, 2016) **解析:** 防己黄芪汤的药物组成：防己、黄芪、白术、甘草、生姜、大枣。

77. **答案:** A **考点:** 完带汤的配伍意义(2014)

**解析:** 完带汤的功用是补脾疏肝，化湿止带。方中重用白术、山药为君，意在补脾祛湿，使脾气健运，湿浊得消；山药并有固肾止带之功。臣以人参补中益气，以助君药补脾之力；苍术燥湿运脾，以增祛湿化浊之力；白芍柔肝理脾，使肝木条达而脾土自强；车前

子利湿清热，令湿浊从小便分利。佐以陈皮理气燥湿，既可使补药补而不滞，又可行气以化湿；柴胡、荆芥穗之辛散，得白术则升发脾胃清阳，配白芍则疏肝解郁；使以甘草调药和中。

78. **答案:** C **考点:** 二陈汤、半夏白术天麻汤的组成药物(2016)

**解析:** 二陈汤的组成为半夏、橘红、白茯苓、甘草、乌梅、生姜。半夏白术天麻汤的组成为半夏、天麻、茯苓、橘红、白术、甘草、生姜、大枣。两方的共同药物是半夏、茯苓。

79. **答案:** A **考点:** 温胆汤的主治证候(2014)

**解析:** 温胆汤的功用是理气化痰，和胃利胆，主治胆郁痰扰证。大陷胸汤的功用是泻热逐水，主治水热互结之结胸证。小青龙汤的功用是解表散寒，温肺化饮，主治外寒里饮证。小陷胸汤的功用是清热化痰，宽胸散结，主治痰热互结之结胸证。半夏泻心汤的功用是寒热平调，消痞散结，主治寒热错杂之痞证。

80. **答案:** E **考点:** 清气化痰丸的功用(2013)

**解析:** 小陷胸汤的功用是清热化痰，宽胸散结，主治痰热互结之结胸证。小青龙汤的功用是解表散寒，温肺化饮，主治外寒里饮证。大青龙汤的功用是发汗解表，兼清里热，主治外感风寒，内有郁热证。麻杏石甘汤的功用是辛凉疏表，清肺平喘，主治外感风邪，邪热壅肺证。清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳，主治痰热咳嗽。

81. **答案:** C **考点:** 清气化痰丸的主治证候

(2016) **解析:** 桑杏汤的功用是清宣温燥、润燥止咳，主治外感温燥证。温胆汤的功用是理气化痰、和胃利胆，主治胆郁痰扰证。清气化痰丸的功用是清热化痰、理气止咳，主治痰热咳嗽。清燥救肺汤的功用是清燥润肺、养阴益气，主治温燥伤肺，气阴两伤证。贝母瓜蒌散的功用是润肺清热，理气化痰，主治燥痰咳嗽。

82. **答案:** E **考点:** 半夏白术天麻汤的主治证候(2006, 2014)

**解析:** 眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑，为风痰上扰之表现。半夏白术天麻汤燥湿化痰，平肝息风，主治风痰上扰。

83. **答案:** D **考点:** 保和丸的组成药物(2015)

**解析:** 保和丸的功用是消食和胃，主治食滞

胃脘证，组成为山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。

84. **答案:** E **考点:** 乌梅丸的全方配伍特点(2014) **解析:** 乌梅丸的配伍特点: 一是酸苦辛并进, 使“蛔得酸则静, 得辛则伏, 得苦则下”。二是寒热并用, 邪正兼顾。

85. **答案:** B

86. **答案:** A **考点:** 虚实真假的病机(2017) **解析:** 真实假虚是指病机的本质为实, 临床上表现出某些虚的假象, “大实有羸状”, 如瘀血内阻而出现妇女崩漏下血。真虚假实是指病机的本质是虚, 临床上表现出某些实的假象, “至虚有盛候”, 如脾气虚弱而出现食少脘腹胀满。

87. **答案:** A

88. **答案:** D **考点:** 阴阳的基本概念(2018) **解析:** 昼为阳, 夜为阴。而上午为阳中之阳, 下午为阳中之阴; 前半夜为阴中之阴, 后半夜为阴中之阳。

89. **答案:** A

90. **答案:** B **考点:** 肺、肾的生理功能(2018) **解析:** 肺主行水; 肾主水。

91. **答案:** D

92. **答案:** E **考点:** 五脏的外华(2018) **解析:** 略。

93. **答案:** C

94. **答案:** B **考点:** 小肠、大肠的生理功能(2018) **解析:** 略。

95. **答案:** D

96. **答案:** E **考点:** 气的生理功能(2018) **解析:** 推动作用: 激发、促进人体的生长发育; 温煦作用: 维持人体体温相对恒定, 维持人体各脏腑经络组织的正常生理活动, 维持人体精血津液等液态物质正常的循行和代谢; 防御作用: 护卫肌表, 抵御外邪; 固摄作用: 统摄血、津液、精液等液态物质, 防止其无故流失; 气化作用: 促进精、气、血、津液的新陈代谢以及相互转化; 营养作用: 为机体各脏腑组织提供营养物质; 中介作用:

97. **答案:** B

98. **答案:** A **考点:** 血的生成与循行(2018) **解析:** 血液是以水谷精微和精髓为主要物质基础, 在脾胃、心肺、肝肾等脏腑的共同盛

力作用下而生成。血液的正常运行, 与心、肺、肝、脾等脏腑的功能密切相关, 尤其以心最为重要。

99. **答案:** B

100. **答案:** A **考点:** 十二经脉走向规律(2018) **解析:** 手三阴经从胸走手, 手三阳经从手走头, 足三阳经从头走足, 足三阴经从足走胸腹。

101. **答案:** A

102. **答案:** B **考点:** 风邪、寒邪的性质及致病特点(2018) **解析:** 风性善行数变; 寒性凝滞、收引。

103. **答案:** A

104. **答案:** E **考点:** 七情内伤的致病特点(2018) **解析:** 怒则气上, 喜则气缓, 悲则气消, 恐则气下, 惊则气乱, 思则气结, 忧则气郁。

105. **答案:** B

106. **答案:** A **考点:** 风淫证、寒淫证(2016) **解析:** 寒淫证的临床表现: 恶寒重, 或伴发热, 无汗, 头身疼痛, 鼻塞流清涕, 脉浮紧, 或咳喘痰鸣, 咳痰稀白; 或脘腹冷痛, 呕吐清稀, 肠鸣泄泻; 或局部冷痛拘急; 或四肢厥冷, 面色苍白口淡不渴, 或渴喜热饮, 小便清长, 舌苔白润, 脉紧或迟而有力。风淫证的临床表现: 恶风, 微发热, 汗出, 头痛, 喷嚏, 鼻塞流涕, 咽喉痒痛, 舌苔薄白, 脉浮缓, 或突发皮肤瘙痒, 风团时隐时现; 或突发口眼喎斜, 肌肤麻木不仁; 或肌肉强直、痉挛, 肢体抽搐, 角弓反张; 或肢体关节游走性疼痛; 新起颜面、眼睑、周身浮肿等。

107. **答案:** A

108. **答案:** B **考点:** 喜证、悲恐证(2016) **解析:** 喜伤证的临床表现: 精神涣散, 得意忘形, 语无伦次, 举止失常, 甚者癫疯狂乱, 哭笑无常。怒伤证的临床表现: 头胀头痛, 面红目赤, 呕逆吐血, 腹胀, 泄泻, 自觉气冲胸满, 甚至神昏, 不省人事。忧伤证的临床表现: 情绪抑郁, 闷闷不乐, 善叹息, 胸闷脘痞, 干咳少痰, 甚则咯血或痰中带血, 面白无华, 消瘦, 神疲乏力。思伤证的临床表现: 表情淡漠, 神思恍惚, 食少纳呆, 胸闷、腹胀、脘痞, 便溏, 甚者心悸健忘, 失眠消瘦, 面色萎黄。悲伤证的临床表现: 善

悲喜哭，精神沮丧，面色惨淡，神疲乏力，甚者心悸怔忡，健忘失眠，意志消沉。恐伤证的临床表现：怵惕不安，常欲闭户独处，暴病则二便失禁，身体不支，久病则骨瘦痿厥，遗精遗尿。惊伤证的临床表现：惊悸，怔忡，胆怯，失眠，坐卧不安，情绪波动，健忘失眠，甚则神志错乱。

109. 答案：D

110. 答案：C 考点：气陷证、气不固证(2016)

**解析：**气虚不固证的临床表现：少气懒言，乏力，舌淡，脉虚无力或自汗或出血，或大便失禁，或余沥不尽，遗尿，小便失禁，滑胎小产，遗精早泄。气陷证的临床表现：头晕目眩，少气倦怠，便意频频，久泻久痢，形体消瘦，腹部有坠胀感，内脏下垂，脱肛，子宫脱垂，舌淡苔白，脉弱。

111. 答案：E

112. 答案：D 考点：痰证(2014)

**解析：**痰浊阻于肺，宣降失常，肺气不逆，故咳嗽，气喘，咳痰。气为痰阻，肺气不利，故胸闷不舒。痰阻气道，痰随气逆，故见喉中痰鸣。痰浊停于胃，胃失和降，故脘痞纳呆；胃气上逆则恶心，呕吐痰涎。痰可随气升降，流窜全身，如痰蒙清窍则头晕目眩，痰迷心窍，心神受蒙，则见表情淡漠、神昏神乱。痰浊停聚或流窜经络，气血运行不畅，则见肢体麻木，半身不遂；痰结皮下、肌肉，局部气血不畅，凝聚成块。在颈则见气瘰、瘰疬，在肢体则见痰核，在乳房则见乳癖，在咽喉可见梅核气，即喉中有异物梗阻感，吞之不下，吐之不出。苔白腻，脉滑为痰浊内阻之象。

113. 答案：D

114. 答案：E 考点：肠热腑实证、肠燥津亏证(2014)

**解析：**肠热腑实证的临床表现：脐腹胀满疼痛，拒按，大便秘结或热结旁流，小便短赤，高热或日晡潮热，汗出口渴；或失眠狂乱，其则神昏谵语，舌红苔黄厚干焦；或起芒刺甚则焦黑燥裂，脉沉迟有力或滑数。肠燥津亏的临床表现：大便干结难解，数日一行，口干咽燥，或伴头晕、口臭、暖气、腹胀，舌红少津苔黄燥，脉细涩。

115. 答案：B

116. 答案：C 考点：脾虚气陷证、寒湿困

脾证(2014)**解析：**脾虚气陷证的临床表现：除脾气虚证表现外，尚见眩晕耳鸣，脘腹坠胀，便意频数，肛门重坠，或久泻久痢，或小便浑浊如米泔，或脱肛、子宫下垂、胃肾下垂、眼睑下垂，舌淡苔白，脉弱。寒湿困脾的临床表现：脘腹痞闷胀痛，泛恶欲吐，口淡不渴，纳呆便溏，头身困重，或身目发黄，晦暗如烟熏色，或浮肿，小便短少，或妇女白带量多清稀，舌淡胖苔白腻，脉濡缓。

117. 答案：A

118. 答案：D 考点：肾阴虚证、肾气不固证(2014)

**解析：**肾阴虚证的临床表现：腰膝酸软而痛，眩晕耳鸣，失眠多梦，形体消瘦，潮热盗汗，五心烦热，咽干颧红，男子阳强易举，遗精早泄，女子经少经闭，或见崩漏，舌红少苔或无苔，脉细数。肾气不固证的临床表现：腰膝酸软，神疲乏力，耳鸣耳聋；尿频数清长，夜尿频多，或遗尿，或尿后余沥不尽，或尿失禁；男子滑精、早泄，女子月经淋漓不尽，带下清稀量多，或胎动易滑；舌淡苔白、脉弱。

119. 答案：E

120. 答案：D 考点：心肾不交、肝肾阴虚证(2014)

**解析：**心肾不交证的临床表现：心烦不寐，惊悸多梦，头晕耳鸣，健忘，腰膝酸软，遗精、梦交，五心烦热，口干咽燥，潮热盗汗，舌红少苔或无苔，少津，脉细数；或伴见腰部下肢酸困发冷，脉细弱。肝肾阴虚的临床表现：头晕目眩，耳鸣健忘，失眠多梦，腰膝酸软，肋肋胀痛，口燥咽干，五心烦热，颧红盗汗，男子遗精，女子经少，舌红少苔，脉细数。

121. 答案：C

122. 答案：B 考点：心肾不交、心脾气血虚证(2016)

**解析：**心脾两虚证的临床表现：心悸怔忡，眩晕耳鸣，失眠多梦，食欲不振，腹胀便溏，面色萎黄，神疲乏力，或见皮下出血，妇女月经量少色淡，淋漓不尽，舌淡嫩，脉细弱。心肾不交证的临床表现：心烦不寐，惊悸多梦，头晕耳鸣，健忘，腰膝酸软，遗精、梦交，五心烦热，口干咽燥，潮热盗汗，舌红少苔或无苔，少津，脉细数；或伴见腰部下肢酸困发冷，脉细弱。

123. 答案：E

124. **答案:** B **考点:** 鹿茸、巴戟天、淫羊藿(2018) **解析:** 鹿茸壮元阳, 补气血, 益精髓, 强筋骨。治虚劳羸瘦, 精神倦乏, 眩晕, 耳聋, 目暗, 腰膝酸痛, 阳痿, 滑精; 子宫虚冷, 崩漏, 带下。巴戟天补肾阳, 强筋骨, 祛风湿。用于阳痿遗精, 宫冷不孕, 月经不调, 少腹冷痛, 风湿痹痛, 筋骨痿软。淫羊藿补肾阳, 强筋骨, 祛风湿。用于阳痿遗精, 筋骨痿软, 风湿痹痛, 麻木拘挛; 更年期高血压。

125. **答案:** A

126. **答案:** B **考点:** 阿胶、黄芪(2018) **解析:** 阿胶补血滋阴, 润燥, 止血。用于血虚萎黄, 眩晕心悸, 肌痿无力, 心烦不眠, 虚风内动, 肺燥咳嗽, 劳嗽咯血, 吐血尿血, 便血崩漏, 妊娠胎漏。黄芪补气固表, 利尿托毒, 排脓, 敛疮生肌。用于气虚乏力, 食少便溏, 中气下陷, 久泻脱肛, 便血崩漏, 表虚自汗, 气虚水肿, 痈疽难溃, 久溃不敛, 血虚痿黄, 内热消渴; 慢性肾炎蛋白尿, 糖尿病。

127. **答案:** D

128. **答案:** B **考点:** 北沙参、石斛(2018) **解析:** 北沙参归肺、胃经, 养阴清肺, 益胃生津。用于肺热燥咳, 劳嗽痰血, 热病津伤口渴。石斛归胃、肾经, 益胃生津, 滋阴清热。用于阴伤津亏, 口干烦渴, 食少干呕, 病后虚热, 目暗不明。

129. **答案:** B

130. **答案:** D **考点:** 右归丸、左归丸的功用(2014) **解析:** 炙甘草汤益气养阴, 通阳复脉。右归丸温补肾阳, 填精益髓。地黄饮子滋肾阴, 补肾阳, 开窍化痰。左归丸滋阴补肾, 填精益髓。大补阴丸滋阴降火。

131. **答案:** C

132. **答案:** B **考点:** 酸枣仁汤、血府逐瘀汤的主治证候(2013) **解析:** 小活络丹主治风寒湿痹。血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。酸枣仁汤主治肝血不足, 虚热内扰证。炙甘草汤主治阴血阳气虚弱, 心脉失养证; 虚劳肺痿。失笑散主治瘀血停滞证。

133. **答案:** A

134. **答案:** E **考点:** 越鞠丸、天台乌药散的功用(2016) **解析:** 越鞠丸主治六郁证,

功用为行气解郁。半夏厚朴汤主治痰气郁结于咽喉之梅核气, 功用为行气散结, 降逆化痰。厚朴温中汤主治脾胃寒湿气滞证, 功用为行气除满, 温中燥湿。旋覆代赭汤主治胃虚, 痰阻气逆证, 功用为降逆化痰, 益气和胃。天台乌药散主治肝经寒凝气滞证, 功用为行气疏肝, 散寒止痛。

135. **答案:** C

136. **答案:** E **考点:** 失笑散、桂枝茯苓丸的功用(2016) **解析:** 温经汤主治冲任虚寒、瘀血阻滞证, 功用为温经散寒, 养血祛瘀。生化汤主治血虚寒凝, 瘀血阻滞证, 功用为养血活血, 温经止痛。失笑散主治瘀血停滞证, 功用为活血祛瘀, 散结止痛。补阳还五汤主治中风之气虚血瘀证, 功用为补气活血通络。桂枝茯苓丸主治瘀阻胞宫证, 功用为活血化瘀, 缓消癥块。

137. **答案:** C

138. **答案:** E **考点:** 川芎茶调散的配伍意义(2016) **解析:** 川芎茶调散主治外感风邪头痛。李东垣谓“头痛须用川芎。如不愈, 各加引经药, 太阳羌活, 阳明白芷”。方中川芎长于治疗少阳、厥阴经头痛; 羌活长于治疗太阳经头痛; 白芷长于治疗阳明经头痛; 细辛长于治疗少阴经头痛。

139. **答案:** B

140. **答案:** E **考点:** 清燥救肺汤、玉液汤的组成药物(2016) **解析:** 清燥救肺汤能清燥润肺、养阴益气, 主治温燥伤肺, 气阴两伤证。方中组成为桑叶、石膏、甘草、人参、胡麻仁、阿胶、麦门冬、杏仁、枇杷叶。玉液汤的功用是益气滋阴、固肾止咳, 主治消渴之气阴两虚证。方中组成为山药、生黄芪、知母、生鸡内金、葛根、五味子、天花粉。

141. **答案:** B

142. **答案:** D **考点:** 麦门冬汤、旋覆代赭汤的配伍意义(2014) **解析:** 麦门冬汤的功用是清养肺胃, 降逆下气, 主治虚热肺痿以及胃阴不足证。方中重用麦冬为君, 既养肺胃之阴又清肺胃虚热, 佐以半夏降逆下气, 化其痰涎, 其使用比例为7:1。旋覆代赭汤的功用是降逆化痰、益气和胃, 主治胃虚痰阻气逆证。方中重用旋覆花下气消痰, 降逆止呕为君, 代赭石质重沉降, 善镇冲逆, 气

味苦寒，用量较小，比例为 3:1。

143. **答案：**C

144. **答案：**D **考点：**连朴饮、桑螵蛸散的组成药物（2016）**解析：**三仁汤的组成为杏仁、飞滑石、白通草、白蔻仁、竹叶、厚朴、生薏苡仁、半夏。九仙散的组成为人参、款冬花、桑白皮、桔梗、五味子、阿胶、乌梅、贝母、罂粟壳。连朴饮的组成为制厚朴、川连、石菖蒲、制半夏、香豉、焦栀、芦根。桑螵蛸散的组成为桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、龟甲。甘露消毒丹的组成为飞滑石、淡黄芩、绵茵陈、石菖蒲、川贝母、木通、藿香、连翘、白蔻仁、薄荷、射干。

145. **答案：**A

146. **答案：**D **考点：**五苓散、猪苓汤的配伍意义（2014）**解析：**五苓散的功用是利水渗湿，温阳化气，方中重用泽泻为君，甘淡利水渗湿，臣以茯苓、猪苓淡渗，增强其利水渗湿之力，佐以白术，和茯苓健脾以运化水湿，佐以桂枝温阳化气以助利水，解表散邪以祛表邪。猪苓汤的功用是利水养阴清热，方中猪苓为君，专以淡渗利湿，臣以泽泻、茯苓甘淡，增加猪苓利水渗湿之力，且泽泻性寒能泄热，茯苓尚可健脾运湿，佐以滑石甘寒，利水、清热两彰其功，阿胶滋阴润燥，既益已伤之阴，又防诸药渗利重伤阴血。

147. **答案：**B

148. **答案：**C **考点：**易黄汤、完带汤的主治证候（2016）**解析：**二妙散的功用是清热燥湿，主治湿热下注证。易黄汤的功用是固肾止带，清热祛湿，主治肾虚湿热带下。完带汤的功用是补脾疏肝，化湿止带，主治脾虚肝郁，湿浊带下。参苓白术散的功用是益气健脾，渗湿止泻，主治脾虚湿盛证。龙胆泻肝汤的功用是清泻肝胆实火，清利肝胆湿热，主治肝胆实火上炎证，肝经湿热下注证。

149. **答案：**B

150. **答案：**B

## 第二单元参考答案

1. **答案:** A **考点:** 尿液的化学检查(2016) **解析:** A 见于肾小球肾炎、肾病综合征等; B 见于肾盂肾炎、间质性肾炎、中毒性肾病等; C 见于慢性肾小球肾炎、糖尿病肾病等; D 见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症、大面积心肌梗死等; E 见于泌尿道疾病产生的脓血、黏液或阴道分泌物掺入尿中。
2. **答案:** C **考点:** 尿液的显微镜检查(2015) **解析:** A 提示肾脏病变在急性期。B 分为粗颗粒管型和细颗粒管型,粗颗粒管型见于慢性肾小球肾炎、肾盂肾炎等;大量细颗粒管型见于慢性肾小球肾炎或急性肾小球肾炎后期。C 偶见于健康人;少量出现见于剧烈运动、高热等;明显增多提示肾实质病变,如肾病综合征、慢性肾炎等。D 见于慢性肾小球肾炎晚期、慢性肾衰竭及肾淀粉样变性。E 见于肾病综合征、慢性肾小球肾炎急性发作、中毒性肾病。
3. **答案:** C **考点:** 尿液的显微镜检查(2013) **解析:** 颗粒管型分为粗颗粒管型和细颗粒管型,粗颗粒管型见于慢性肾小球肾炎、肾盂肾炎等;细颗粒管型见于慢性肾小球肾炎或急性肾小球肾炎后期。
4. **答案:** D **考点:** 粪便一般性状检查(2016) **解析:** A 见于各种感染性或非感染性腹泻,如急性胃肠炎、甲状腺功能亢进等;B 常见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等;C 见于霍乱;D 见于各种原因引起的上消化道出血;E 见于肠道下段出血,如痔疮、肛裂、直肠癌等。
5. **答案:** B **考点:** 漏出液(2015) **解析:** 漏出液的细胞计数常 $<100 \times 10^6/L$ ,渗出液的细胞计数常 $>500 \times 10^6/L$ 。
6. **答案:** C **考点:** 心电图各波段的意义(2016) **解析:** A 反映左、右心室除极过程中的电位和时间变化;B 反映电激动过程在房室交界区及其后的希氏束、室内传导系统所产生的微弱变化;C 反映左、右心室除极与复极全过程的时间;D 反映心室早期缓慢复极的电位和时间变化;E 反映心室晚期快

速复极到下一个心电活动开始的电位和时间变化。

7. **答案:** D **考点:** 心室肥大(2015) **解析:** 左心室肥大心电图表现:①QRS波群电压增高:Rv5或Rv6 $>2.5mV$ ,Rv5或Rv6+Sv1 $>4.0mV$ (男)或 $>3.5mV$ (女)。②心电轴左偏。③QRS波群时间延长到 $0.10 \sim 0.11s$ 。④ST-T改变以R波为主的导联中,S-T段下移 $\geq 0.05mV$ ,T波低平、双向或倒置。D选项是左心室肥大的心电图表现。

8. **答案:** E **考点:** 心肌梗死(2016) **解析:** A 相应导联V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub>;B 相应导联V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub>;C 相应导联I、aVL、V<sub>5</sub>;D 相应导联V<sub>7</sub>、V<sub>8</sub>、V<sub>9</sub>;E 相应导联II、III、aVF。

9. **答案:** C **考点:** 心律失常(2016) **解析:** 房性期前收缩心电图表现为提早出现的P'波,形态与窦性P波不同;一般情况下,房性P'波后有正常形态QRS波群,但若房室交界区或心室处于绝对不应期,可使房性P'波后没有QRS波群;P'-R间期 $\geq 0.12s$ ;代偿间歇不完全。

10. **答案:** C **考点:** 消化系统常见病的影像学表现(2013) **解析:** 急性胃穿孔X线征象表现为膈下游离气体,双侧膈下线条状或新月状透光影;幽门梗阻X线征象表现为梗阻上段扩张、积液;消化性溃疡X线直接征象表现为龛影;上消化道出血、慢性胃炎因其特异性不高,临床检查不作为首选。

11. **答案:** C **考点:** 消化系统常见病的影像学表现(2016) **解析:** 十二指肠球部溃疡的直接X线征象是球部龛影或变形。间接X线征象是激惹征;幽门痉挛,开放延迟;胃分泌增多和胃张力及蠕动方面的改变;球部固定压痛。

12. **答案:** A **考点:** 消化系统常见病的影像学表现(2006,2015) **解析:** 膈下游离气体影见于胃肠道穿孔。B见肠道扩张,胀气,有团块影;C可见杯口状影;D见肝区影模糊,下腹部可有高密度影;E见结肠区有团块影。

13. **答案:** E **考点:** 泌尿系统常见病的影像学表现(2016) **解析:** 肾结石平片检查示结石主要位于肾盂或肾盏内,表现为圆形或卵圆形高密度影,尿路造影可显示肾盂肾盏扩

张积水,阳性结石常被造影剂掩盖,阴性结石显示充盈缺损。

14. **答案:** A **考点:** 骨与关节常见病的影像学表现(2016) **解析:** Codman 三角又称为骨膜三角。良性骨肿瘤多无骨膜增生;恶性骨肿瘤常有骨膜增生,并且骨膜新生骨可被肿瘤破坏,形成恶性骨肿瘤的特征性 X 线表现—Codman 三角。

15. **答案:** B **解析:** 耳源性眩晕是指前庭迷路感受异常引起的眩晕。当发生迷路积水(梅尼埃综合征)、晕动病(晕舟车病)、迷路炎、迷路出血或中毒、前庭神经炎或损害、中耳感染等都可引起体位平衡障碍,发生眩晕。由于前庭核通过内侧束与动眼神经核之间联系。

16. **答案:** B **解析:** 意识障碍的临床表现有嗜睡、昏睡、昏迷、意识模糊及谵妄。

17. **答案:** C **解析:** 回归热是指体温骤然升至 39 度以上,持续数日后又骤然下降至正常水平,高热期与无热期各持续若干日后即有规律地交替一次。可见于霍奇金病。

18. **答案:** E **解析:** 二尖瓣狭窄可于心尖部听到隆隆样舒张中晚期杂音。

19. **答案:** A **解析:** 循环系统的问诊内容包括:①心悸发生的时间与诱因,心前区疼痛的性质、程度以及出现和持续的时间、有无放射、放射的部位、引起疼痛发作的诱因和缓解方法;②呼吸困难出现的诱因和程度,发作时与体力活动和体位的关系;③有无咳嗽、咯血、咳痰等;④水肿出现的部位和时间,有无腹水、肝区疼痛、头痛、头晕、晕厥等;⑤既往是否有过类似的症状;⑥有无高血压、动脉硬化、心脏病等。

20. **答案:** D **解析:** 主诉应记录患者就诊的主要原因及其发生的时间。其原因通常为患者自诉的主要(或最痛苦)症状及其性质,因此,不能是“尽量使用诊断性术语”。为了使主要原因症状突出、扼要,要求字数精炼简洁,一般不超过 20 字;症状不突出者,可把就医主要目的作为主诉。疾病的诊断通常依据其症状、体征和辅助检查结果,所以,确切的主诉可作为诊断的向导。

21. **答案:** E **解析:** 2. 心力衰竭时心电图一般没有特异性改变。急性前壁心肌梗死时最

常见的心律失常为室性早搏。

22. **答案:** A **解析:** 典型心绞痛发作时可出现暂时性急性心肌缺血的表现,面对缺血区的导联上出现 ST 段水平型或下垂型压低  $\geq 0.1\text{mV}$ , T 波倒置、低平或双向。变异型心绞痛的心电图特点为 ST 段抬高,常伴 T 波高耸,对应导联则表现为 ST 段压低。

23. **答案:** B **解析:** Q-T 间期指 QRS 波群起点到 T 波终点间的距离,代表心室除极开始到复极结束所需要的总时间。一般为 0.32~0.44 秒,常常受年龄、心率及迷走神经张力的影响而变化,也容易受药物的影响。心率越快, Q-T 间期越短,反之越长。临床中常用 Barrett 公式求出:  $Q-T = 0.39 \times (R-R) \pm 0.04$  秒。常用校正的 Q-T 间期(Q-Tc)来纠正心率对 Q-T 的影响,  $Q-Tc = Q-T / R-R$ 。Q-Tc 就是 R-R 间期为 1 秒(心率 60 次/分)时的 Q-T 间期。传统的 Q-Tc 的正常 E 限值为 0.44 秒,超过此值即认为 Q-T 间期延长。Q-T 间期在不同导联之间存在一定差异,正常人不同导联间的 Q-T 间期差异最大可达 0.05 秒,以 V2、V3 导联最长。

24. **答案:** D **解析:** U 波,振幅很小,在心前导联特别是 V3 较清楚,可高达 0.2~0.3mV。U 波明显增高常见于血钾过低、服用奎尼丁等。U 波倒置见于冠心病或运动测验时;U 波增大时常伴有心室肌应激性增高,易诱发室性心律失常。

25. **答案:** B **解析:** 预激综合征临床表现为 P-R 间期缩短在 0.12 秒以内,多数为 0.10 秒, P 为窦性, QRS 时限延长到 0.11 秒以上,但 P-T 间期正常;有继发性 ST-T 改变,通常 T 波与预激波方向相反。

26. **答案:** C **解析:** 胸部 X 线检查可以了解有无胸水,但是不能了解胸水的性质。可以了解肺实质炎症的侵犯范围,鉴别是大叶性肺炎或小叶性肺炎(支气管肺炎),了解有无气胸(肺被压缩,不见肺纹理)或者肺大泡(可见肺纹理)的情况,鉴别肺不张(肺容积缩小)或肺实变,鉴别肺脓肿(有无气液平)或肺肿瘤。

27. **答案:** B **解析:** 左心室增大多由高血压病、主动脉瓣病变、二尖瓣关闭不全、扩张型心肌病和动脉管未闭等引起。左心室增大

的方向是向左、向下和向后隆凸。主动脉瓣病变时为后前位，左室增大显示左室段延长，心尖向下延伸。可伸入膈下或见于胃泡阴影之内，相反搏动点上移，肺动脉段相对地凹陷，称“主动脉瓣型”心脏，也称为靴形心。

28. **答案：**D **解析：**实记题。

29. **答案：**D **解析：**实记题。

30. **答案：**C **解析：**实记题。

31. **答案：**B **考点：**溃疡性结肠炎的病理(2017)。**解析：**溃疡性结肠炎病变主要位于直肠和乙状结肠。

32. **答案：**D **考点：**慢性胃炎实验室及其他检查(2017)。**解析：**胃镜检查并取活组织做病理组织学检查是慢性胃炎的确诊方法。

33. **答案：**E **考点：**休克的治疗(2017)。**解析：**略。

34. **答案：**B **考点：**类风湿关节炎关节表现(2017)。**解析：**疼痛及压痛往往是最早出现的表现。

35. **答案：**D **解析：**临床分型(1)完全性卒中 发病后神经功能缺失症状较重、较完全，常有完全性瘫痪及昏迷，于数小时内(<6小时)达到高峰。(2)进展性卒中 发病后神经功能缺失症状在48小时内逐渐进展或呈阶梯式加重。(3)可逆性缺血性神经功能缺失 发病后神经缺失症状较轻，持续24小时以上，但可于3周内恢复，不留后遗症

36. **答案：**D **解析：**脑CT的临床意义1.颅内肿瘤。2.脑血管病：(1)脑出血。(2)脑梗塞。(3)蛛网膜下腔出血。(4)动脉瘤及血管畸形。(5)脑静脉或静脉窦闭塞。(6)烟雾病。3.颅脑损伤：(1)颅内血肿。(2)脑挫裂伤。(3)颅骨骨折及颅缝分离。(4)亚急性或慢性颅脑损伤。4.颅内炎性病变：(1)脑脓肿。(2)肉芽肿。(3)脑炎。(4)脑膜炎。(5)硬膜外及硬膜下脓肿。(6)室管膜炎。5.脑寄生虫病。6.脑退行性病变。7.先天性畸形与新生儿疾病。8.手术与放射治疗后检查。

37. **答案：**E **解析：**腔隙性脑梗死(LACI)表现为各种腔隙综合征，如纯运动性轻瘫、纯感觉性卒中、共济失调性轻偏瘫等。梗死灶直径小于1.5~2.0cm。常由高血压性小动脉硬化引起。

38. **答案：**A **解析：**全面强直-阵挛好发于

清晨醒后。

39. **答案：**A **解析：**休克期(微血管扩张期)全身皮肤青紫、发凉、口干明显。

40. **答案：**B **解析：**休克是复杂的病理生理过程，导致休克的病因不同，始动环节不同，但病情发展到一定程度，其病理生理改变基本相同。有效循环血容量绝对或相对不足，是各类休克的本质。各种病因的休克发生后，机体发生一系列相应的病理生理变化，主要体现在微循环的代偿及失代偿、机体代谢变化、炎症反应及各系统脏器功能障碍甚至衰竭等。

41. **答案：**C **解析：**开始用晶体液1000~2000mL，然后补充胶体液，晶体液与胶体液之比为3:1，胶体液输入量一般不超过1500~2000mL。中度和重度休克应输部分全血。

42. **答案：**E **解析：**热衰竭是由于人体对高温环境不适应，引起周围血管扩张，循环血容量不足，发生虚脱；亦可伴有过多出汗而失水和失钠。

43. **答案：**A **解析：**糖尿病(DM)是一组由于胰岛素分泌和(或)作用缺陷所引起的。以慢性血葡萄糖(血糖)水平增高为特征的代谢性疾病。

44. **答案：**AE **解析：**手术治疗 适应证：①中、重度甲亢，长期服药无效，停药后复发，或不愿长期服药者。②甲状腺显著肿大，压迫邻近器官。③胸骨后甲状腺肿伴甲亢者。④结节性甲状腺肿伴甲亢者。禁忌证：①伴严重Graves 眶病。②合并较重心、肝、肾疾病，不能耐受手术。③妊娠初3个月和第6个月以后。

45. **答案：**E **解析：**淡漠型甲亢多见于老年人，起病隐匿，全身症状明显，以纳差、乏力、消瘦、淡漠为主要表现，易发生心绞痛、心力衰竭、房颤等，高代谢表现、甲状腺肿大及眼征不明显。

46. **答案：**B **解析：**抗甲状腺药物治疗期间，每四周复查血清甲状腺激素水平。

47. **答案：**D **解析：**心律失常，以心房颤动、房性早搏等房性心律失常多见。

48. **答案：**C **解析：**控制感染：如有感染，应尽早使用抗菌药物，并争取在用药前留取

感染灶分泌物、痰、血、大小便进行培养和药敏试验,以指导治疗。若致病菌尚不明确,可根据病史、病情、感染来源选用抗菌药物,一般以广谱抗生素为宜。应多采用抗菌效力不依赖粒细胞数的抗生素如羧苄西林与氨基糖苷类抗生素如阿米卡星、妥布霉素或氧氟沙星联合使用。

49. **答案:** D **解析:** 出血与血小板减少有关,少数可因弥散性血管内凝血而发生。牙龈出血、鼻出血、皮肤瘀斑均为常见症状

50. **答案:** E **解析:** 齿龈肿胀多见于急单白血病。

51. **答案:** C **解析:** 尿常规外观多混浊。尿沉渣镜检白细胞 $>5$ 个/HP,诊断意义较大;部分患者可有红细胞,少数出现肉眼血尿。尿蛋白含量多为 $\pm\sim+$ 。出现白细胞管型多提示为肾盂肾炎。

52. **答案:** D **解析:** 急性肾盂肾炎常伴有血白细胞计数升高和血沉增快。

53. **答案:** A **解析:** 慢性肾炎应首先鉴别的继发性肾小球疾病是狼疮肾炎。

54. **答案:** D **解析:** 幽门管溃疡发生于幽门孔2cm以内的溃疡称为幽门管溃疡,男性多见,一般呈高胃酸分泌,常缺乏典型的周期性和节律性疼痛而表现为餐后立即出现的中上腹剧烈疼痛,应用抗酸药可部分缓解,易并发幽门痉挛、幽门狭窄及出血,内科治疗效果较差。

55. **答案:** C **解析:** 减少肠道毒物的生成和吸收:限制蛋白质摄入,灌肠或导泻以清除肠内积食、积血或其他含氮物质,减少氨的产生和吸收。乳果糖对急性门体分流性脑病特别有效。抗生素口服可抑制肠道细菌生长,抑制氨的生成,与乳果糖合用有协同作用

56. **答案:** E **解析:** 黏液血便是溃疡性结肠炎活动期的重要表现。病变局限在直肠者,鲜血附于粪便表面;病变扩展至直肠以上者,血液混于粪便中。病变累及直肠时,可有里急后重。

57. **答案:** C **解析:** 柳氮磺吡啶(SASP),适用于轻、中型患者及重型经糖皮质激素治疗病情缓解者,病情缓解后改为维持量维持治疗,服用SASP的同时应补充叶酸。

58. **答案:** A **解析:** 大多数患者于心绞痛发

作时出现暂时性ST段压低 $\geq 0.1$ mV,提示内膜下心肌缺血,可伴有T波倒置,发作缓解后恢复;有时相关导联ST段抬高,提示透壁性心肌缺血,为变异型心绞痛的特征。

59. **答案:** B **解析:** ①肌红蛋白:起病后2小时内升高,12小时内达高峰;24~48小时内恢复正常。②肌钙蛋白I(cTnI)或T(cTnT):起病3~4小时后升高,cTnI于11~24小时达高峰,7~10天降至正常,cTnT于24~48小时达高峰,10~14天降至正常。③肌酸激酶同工酶CK-MB:在起病后4小时内增高,16~24小时达高峰,3~4天恢复正常,其增高的程度能较准确地反映梗死的范围,其高峰出现时间是否提前有助于判断溶栓治疗是否成功。

60. **答案:** C **解析:** 同步直流电复律:用于伴有血流动力学异常的室速。

61. **答案:** E **考点:** 流行性出血热临床表现(2013) **解析:** 流行性出血热主要表现为发热、全身中毒症状、毛细血管损伤和肾损害,毛细血管损害征主要表现为充血、出血和渗出水肿征,皮肤充血潮红主要见于颜面、颈、胸部等部位,重者呈醉酒貌。

62. **答案:** B **考点:** 流行性出血热的治疗(2013,2014) **解析:** 流行性出血热低血压休克期治疗原则:积极补充血容量、注意纠正酸中毒和改善微循环。

63. **答案:** D **考点:** 流行性出血热的治疗(2015) **解析:** 流行性出血热少尿期治疗原则为“稳、促、导、透”,即稳定内环境、促进利尿、导泻和透析治疗。

64. **答案:** E **考点:** 狂犬病的流行病学(2014) **解析:** 带狂犬病毒的动物是本病传染源,我国狂犬病主要传染源是病犬,蝙蝠、臭鼬、浣熊等野生动物也成为主要传染源,一般来说,狂犬病患者不是传染源。

65. **答案:** C **考点:** 狂犬病的临床表现(2016) **解析:** 狂犬病麻痹期的表现为肌肉痉挛减少或停止,进入全身弛缓性瘫痪,尤以肢体软瘫多见。

66. **答案:** E **考点:** 狂犬病的治疗(2015) **解析:** 狂犬病发病后以对症支持等综合治疗为主,包括隔离患者、对症治疗和抗病毒治疗。

67. **答案:** A **考点:** 流行性乙型脑炎的临床表现 (2016) **解析:** 流行性乙型脑炎临床分型: 轻型、普通型、重型、极重型, 流行期间以轻型和普通型患者多见。
68. **答案:** D **考点:** 流行性乙型脑炎的临床表现 (2015) **解析:** 流行性乙型脑炎极期的主要表现为高热、意识障碍、惊厥或抽搐、呼吸衰竭, 其中高热、抽搐、呼吸衰竭是乙脑极期的严重表现, 呼吸衰竭为引起死亡的主要原因。
69. **答案:** E **考点:** 流行性乙型脑炎的实验室检查 (2014) **解析:** 流行性乙型脑炎脑脊液外观无色透明或微浑浊, 白细胞多在  $(50\sim 500)\times 10^9/L$ , 早期以中性粒细胞为主, 蛋白轻度增高, 糖正常或偏高, 氯化物正常。
70. **答案:** D **考点:** 流行性乙型脑炎的鉴别诊断 (2014) **解析:** 乙脑与中毒性菌痢均多见于夏、秋季, 且 10 岁以下儿童发病率较高。中毒性菌痢起病较乙脑更急, 常于发病 24h 内出现高热、抽搐、昏迷等, 一般无脑膜刺激征, 脑脊液多正常, 粪便镜检可见大量脓、白细胞, 中毒性菌痢与流行性乙型脑炎最主要区别为粪便镜检可见大量脓、白细胞。
71. **答案:** D **考点:** 流行性乙型脑炎的治疗 (2016) **解析:** 流行性乙型脑炎患者出现瞳孔不等大、呼吸不规则, 见于乙脑实质病变, 尤其是延脑呼吸中枢病变导致的呼吸衰竭, 多见于重型患者, 治疗时首先采取的措施是吸氧, 通过吸氧纠正患者缺氧状态。
72. **答案:** A **考点:** 流行性脑脊髓膜炎的流行病学 (2015) **解析:** 流行性脑脊髓膜炎传染源是带菌者和流脑患者, 因脑膜炎球菌在外界生活力极弱, 故间接传播极少。
73. **答案:** B **考点:** 流行性脑脊髓膜炎的发病机制 (2013, 2014, 2015) **解析:** 流行性脑脊髓膜炎脑膜炎球菌释放的内毒素是本病致病的重要因素, 内毒素可引起脑膜和脊髓膜化脓性炎症及颅内压升高。
74. **答案:** B **考点:** 流行性脑脊髓膜炎的临床表现 (2014) **解析:** 流行性脑脊髓膜炎潜伏期一般为 2~3 天, 最短 1 天, 最长 7 天, 按病情可分为以下各型: 普通型、暴发型、轻型、慢性型。
75. **答案:** C **考点:** 流行性脑脊髓膜炎的临床表现 (2013) **解析:** 流行性脑脊髓膜炎败血症期出现皮肤黏膜瘀点、瘀斑, 初呈鲜红色, 迅速增多, 扩大。
76. **答案:** A **解析:** 染病的发生、发展和转归, 通常分为潜伏期、前驱期、症状明显期、恢复期。
77. **答案:** A **解析:** 责任报告单位对甲类传染病、传染性非典型肺炎和乙类传染病中艾滋病、肺炭疽、脊髓灰质炎的患者、病原携带者或疑似患者, 城镇应于 2 小时内、农村应于 6 小时内通过传染病疫情监测信息系统进行报告。
78. **答案:** C **解析:** 致敏 B 细胞受抗原刺激后, 即转化为浆细胞并产生能与相应抗原结合的抗体, 即免疫球蛋白 (Ig)。在化学结构上可分为 5 类: IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE, 各具不同功能。在感染过程中 IgM 首先出现, 但持续时间不长, 是近感染的标志; IgG 临近恢复期出现, 并持续较长时期; IgA 主要是呼吸道和消化道黏膜上的局部抗体; IgE 则主要作用于原虫和蠕虫。
79. **答案:** A **解析:** 发热后进入低血压休克期。
80. **答案:** C **解析:** 流感肺外表现较少见。
81. **答案:** A **解析:** 考查菌痢的大便特点。
82. **答案:** B **解析:** 大量吐泻引起水和电解质严重丢失是霍乱的主要病理生理改变, 因此及时补充液体和电解质是治疗本病的关键。
83. **答案:** A **解析:** 《医院感染管理规范 (试行)》中第一条规定, 为加强医院感染管理, 有效预防和控制医院感染, 保障医疗安全, 提高医疗质量, 制定本规范。
84. **答案:** E **解析:** 消毒是指杀灭或清除传播媒介上的病原微生物, 使之达到无害化的处理。
85. **答案:** D **考点:** 突发公共卫生事件应急条例 (2017) **解析:** 全国突发事件应急预案应包括的主要内容: (1) 突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责; (2) 突发事件的监测与预警; (3) 突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度; (4) 突发事件应急处理技术和监测机构及其任务; (5) 突

发事件的分级和应急处理工作方案；(6)突发事件预防、现场控制，应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备与调度；(7)突发事件应急处理专业队伍的建设和培训。

86. **答案：**C **考点：**中华人民共和国传染病防治法(2017) **解析：**传染病暴发、流行时，国务院卫生行政部门负责向社会公布传染病疫情信息，并可以授权省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门向社会公布本行政区域的传染病疫情信息。

87. **答案：**D **考点：**中华人民共和国中医药法(2017) **解析：**承担中医药专家学术经验和技术专长继承工作的指导老师应当具备下列条件：(1)具有较高学术水平和丰富的实践经验、技术专长和良好的职业品德；(2)从事中医药专业工作30年以上并担任高级专监技术职务10年以上。

88. **答案：**D **解析：**法律的社会作用是法律为实现一定的社会目的(尤其是维护一定阶级的社会关系和社会秩序)而发挥的作用。

89. **答案：**E **解析：**《民法通则》规定承担民事责任的方式有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。

90. **答案：**E **解析：**《中华人民共和国执业医师法》第十六条规定，医师注册后有下列情况之一的，其所在的医疗、预防、保健机构应当在三十日内报告准予注册的卫生行政部门，卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书：①死亡或者被宣告失踪的；②受刑事处罚的；③受吊销医师执业证书行政处罚的；④依照本法第三十一条规定暂停执业活动期满，再次考核仍不合格的；⑤中止医师执业活动满二年的；⑥有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

91. **答案：**B **解析：**实记题。

92. **答案：**D **解析：**被乙类、丙类传染病病原体污染的污水、污物、粪便，有关单位和个人必须按照卫生防疫机构提出的卫生要求进行处理。

93. **答案：**E **解析：**实记题。

94. **答案：**A **解析：**实记题。

95. **答案：**D **解析：**实记题。

96. **答案：**B **解析：**湿热证，恶寒发热，身重，关节疼痛，湿在肌肉，不为汗解。宜滑石、大豆黄卷、茯苓皮、苍术皮、藿香叶、鲜荷叶、白通草、桔梗等味，不恶寒者，去苍术皮。薛生白在自注中说本证为“阳湿伤表之候”，是与上条“阴湿伤表之候”相对而言。此时湿邪伤表，且湿已化热，宜用利湿泄热、芳香化湿透表之法治。薛氏在自注中又谓“此条外候与上条同，惟汗出独异”，可见汗之有无是区别阴湿和阳湿的关键，一般认为阴湿者无汗，阳湿者有汗。

97. **答案：**C **解析：**然所云表者，乃太阴阳明之表，而非太阳之表。太阴之表四肢也，阳明也；阳明之表肌肉也，胸中也。

98. **答案：**A **解析：**《金匱要略·水气病脉证并治》：“诸有水者，腰以下肿，当利小便，腰以上肿，当发汗乃愈”

99. **答案：**B **解析：**妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月，衃也。所以血不止者，其癥不去故也。当下其癥，桂枝茯苓丸主之。

100. **答案：**C **解析：**《素问·阴阳应象大论》：其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中满者，泻之于内；其有邪者，渍形以为汗；其在皮者，汗而发之；其慄悍者，按而收之；其实者，散而泻之。

### B1 型题

101. **答案：**E

102. **答案：**D **考点：**心律失常(2013) **解析：**三度房室传导阻滞的心电图特征：P-P与R-R间距各有其固定的规律性；P波频率高于QRS波频率；QRS波群形态正常或宽大畸形。二度I型房室传导阻滞的心电图特征：P波规律出现；P-R间期进行性延长，直至出现一次QRS波脱漏，周而复始；房室传导比例常为3:2、4:3、5:4下传。

103. **答案：**D

104. **答案：**E **考点：**左束支分支传导阻滞

(2016) **解析**: 左前分支传导阻滞的心电图表现是 QRS 平均电轴显著左偏, QRS 波群时间  $\leq 0.11s$ ; 左后分支传导阻滞的心电图表现是 QRS 平均电轴显著右偏, QRS 波群时间  $\leq 0.11s$ 。

105. **答案**: C

106. **答案**: D **考点**: 呼吸系统常见病的影像学表现 (2016) **解析**: 急性粟粒性肺结核 X 线表现为两肺弥漫性大小一致的粟粒样致密阴影; 慢性血行播散型肺结核 X 线表现为分布不均匀、大小不等、密度不均的双肺粟粒或结节; 原发型肺结核 X 线可见肺内哑铃状双极现象; 继发性肺结核包括浸润型肺结核和慢性纤维空洞型肺结核, 浸润型肺结核的征象有斑片状实变、肺段或肺叶实变、结核灶空洞、支气管播散、间质结节和结核球, 慢性纤维空洞型肺结核的征象有纤维索条、斑片状实变、小结节和钙化, 故 X 线可见渗出、增值、播散、纤维和空洞等多种性质病灶同时存在; 结合性胸膜炎 X 线表现无异常或有大量纤维素沉着, 引起胸膜肥厚或钙化粘连。

107. **答案**: C

108. **答案**: A **考点**: 消化系统常见病的影像学表现 (2014) **解析**: 食管癌 X 线钡剂造影可见: ①黏膜皱襞改变: 由于肿瘤破坏黏膜层, 使正常皱襞消失、中断、破坏, 形成表面杂乱的不规则影像。②管腔狭窄。③腔内充盈缺损。④不规则的龛影, 早期较浅小, 较大者表现为长径与食管长轴一致的长形龛影。⑤受累食管呈局限性僵硬。食管静脉曲张 X 线钡剂造影可见: 食管中、下段的黏膜皱襞明显增宽、迂曲, 呈蚯蚓状或串珠状充盈缺损, 管壁边缘呈锯齿状。

109. **答案**: A **解析**: 考查霍乱的症状。

110. **答案**: E **解析**: 米泔样粪便 (白色淘米水样), 内含黏液片块, 常见于霍乱及副霍乱, 此为烈性传染病, 须及早隔离治疗; 粪便中含有肉眼可见的脓血时称为脓血便, 常见于痢疾、溃疡性结肠炎、结肠或直肠癌、局限性肠炎等。

111. **答案**: D **解析**: 尿液的显微镜检查中, 在低倍镜下观察, 正常人的尿液可出现  $0 \sim$  偶见 / LP 的透明管型。

112. **答案**: B **解析**: 肾盂肾炎患者尿中白细胞明显增多, 在肾小管嵌入蛋白质中形成白细胞管型 (白细胞含量  $> 1 / 3$ )。它不能见于正常人尿中。红细胞管型常见于肾小球肾炎、血型不合输血致溶血反应等; 上皮细胞管型常提示肾小管坏死、肾淀粉样病变、肾小球肾炎等; 蜡样管型见于慢性肾炎、肾衰竭、肾淀粉样病变等。其他 3 种管型也不见于正常人尿中。

113. **答案**: B **解析**: HBsAg 及抗-HBs 测定: ①HBsAg 具有抗原性, 不具有传染性, HBsAg 是感染 HBV 的标志, 其多少与 HBV 的生成量相平行; ②抗-HBs 阳性, 见于注射过乙型肝炎疫苗或曾感染过 HBV, 目前 HBV 已被清除者, 对 HBV 已有了免疫力; ③HBeAg 阳性表示有 HBV 复制, 传染性强; ④抗-HBe 多见于 HBeAg 转阴的患者, 它意味着 HBV 大部分已被清除或抑制、HBV 生成减少, 是传染性降低的一种表现。

114. **答案**: E **解析**: 实记题。

115. **答案**: E **解析**: 2. 心力衰竭时心电图一般没有特异性改变。急性前壁心肌梗死时最常见的心律失常为室性早搏。

116. **答案**: A **解析**: 心力衰竭时心电图一般没有特异性改变。急性前壁心肌梗死时最常见的心律失常为室性早搏。

117. **答案**: D **解析**: 慢性纤维空洞型肺结核的症状。

118. **答案**: B **解析**: 肺脓肿的症状。

119. **答案**: A

120. **答案**: C **考点**: 溃疡性结肠炎的药物治疗 (2017) **解析**: 轻中型溃疡性结肠炎常用柳氮磺吡啶; 糖皮质激素适用于重型和急性爆发型, 或柳氮磺吡啶治疗无效的轻型、中型患者。

121. **答案**: C **解析**: 缺铁性贫血典型表现为小细胞低色素性贫血。MCV  $< 80fl$ , MCHC  $< 32\%$ 。

122. **答案**: D **解析**: 再生障碍性贫血全血细胞减少, 但发病早期可先有一个或两个血细胞系减少。为正常细胞正常色素性贫血。

123. **答案**: A **解析**: 原发性甲减血清 TSH 增高, TT4、FT4 均降低

124. **答案**: B **解析**: 中枢性甲减血清 TSH

减低或者正常，TT4、FT4 降低

125. **答案：**B **解析：**类风湿结节为较特异的皮肤表现，出现在约 20%~30%的患者，多出现在关节隆突部位及皮肤的受压部位，如上肢的鹰嘴突、腕部及下肢的踝部出现皮下小结，大小不一、质硬、无压痛、对称性分布。常提示疾病处于活动阶段。

126. **答案：**E **解析：**晨僵见于 95%以上类风湿关节炎患者，经夜间休息后，晨起时受累关节出现较长时间的僵硬、胶黏着样感觉，一般持续 1 小时以上。

127. **答案：**C **解析：**脑桥出血：一侧脑桥少量出血，表现为交叉性瘫痪，两眼向病灶侧凝视麻痹。但多数累及两侧脑桥，出血破入第四脑室，迅速出现深度昏迷、双侧瞳孔针尖样缩小、四肢瘫痪和中枢性高热的特征性体征，并出现中枢性呼吸障碍和去脑强直，多于数天内死亡。

128. **答案：**D **解析：**小脑出血常有眩晕，频繁呕吐，后枕剧痛，步履不稳，构音障碍，共济失调和眼球震颤而无瘫痪。重症者因血肿压迫脑干或破入第四脑室，迅速出现昏迷、中枢性呼吸困难，常因急性枕骨大孔疝死亡。

129. **答案：**D **解析：**食管胃底静脉曲张破裂大出血使用药物止血，常用垂体后叶素静脉注射，止血后逐渐减量维持 12~14 小时。

130. **答案：**A **解析：**非静脉曲张破裂大出血最常见于消化性溃疡。应提高胃内 pH 值，静脉使用抑制胃酸分泌的药物如西咪替丁、雷尼替丁或质子泵抑制剂奥美拉唑等。

131. **答案：**A **解析：**支原体肺炎属非典型病原体所致的肺炎。

132. **答案：**E **解析：**肺真菌病，如念珠菌肺炎等

133. **答案：**A **解析：**手术治疗为非小细胞肺癌的主要治疗方法，主要适用于 I 期、II 期患者。根治性手术切除是首选的治疗措施，除 I 期患者，II~III 期的患者实施根治手术后需辅助化疗。鳞癌比腺癌和大细胞癌术后效果好。

134. **答案：**D **解析：**放疗对小细胞肺癌效果较好，其次为鳞癌和腺癌，其放射剂量以腺癌最大，小细胞肺癌最小。

135. **答案：**A **解析：**支气管-肺疾病为引起

呼吸衰竭主要病因，常见于慢性阻塞性肺疾病、重症肺结核、肺间质纤维化、肺尘埃沉着症等。

136. **答案：**B **解析：**略

137. **答案：**C **解析：**引起呼吸衰竭病因中属胸廓疾病的是广泛胸膜增厚。

138. **答案：**C **解析：**慢性阻塞性肺疾病可出现两肺散在湿啰音、伴哮鸣音及呼气延长。

139. **答案：**A **解析：**支气管哮喘可出现普遍性哮鸣音，呼气延长。

140. **答案：**D **解析：**支气管肺癌可出现局限性吸气性哮鸣音。

141. **答案：**C **解析：**实记题。

142. **答案：**D **解析：**实记题。

143. **答案：**B **解析：**实记题。

144. **答案：**A **解析：**实记题。

145. **答案：**A **解析：**风温、温热、温疫、温毒、冬温，邪在阳明久羁，或已下，或未下，身热面赤，口干舌燥，甚则齿黑唇裂，脉沉实者，仍可下之；脉虚大，手足心热甚于手足背者，加减复脉汤主之。

146. **答案：**E **解析：**风温、温热、温疫、温毒、冬温，邪在阳明久羁，或已下，或未下，身热面赤，口干舌燥，甚则齿黑唇裂，脉沉实者，仍可下之；脉虚大，手足心热甚于手足背者，加减复脉汤主之。

147. **答案：**C **解析：**师曰：妇人有漏下者，有半产后因续下血都不绝者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻，胶艾汤主之。”若妊娠下血而又腹中痛者，乃冲任失调，阴血下漏，以致不能入胞养胎，故称为胞阻或胞漏，因冲为血海，任主胞胎，冲任虚损，不能约制经血，故淋漓漏下或半产后下血不止，冲任虚而不固，胎失所系，则妊娠下血、腹中疼痛，故用胶艾汤调补冲任，固经安胎。

148. **答案：**D **解析：**妇人怀娠六七月，脉弦发热，其胎愈胀，腹痛恶寒者，少腹如扇，所以然者，子脏开故也，当以附子汤温其脏。这是肾阳亏虚阴寒内盛所致，方选附子汤温阳散寒，暖宫安胎。

149. **答案：**C **解析：**头痛恶寒，身重疼痛，舌白不渴，脉弦细而濡，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，状若阴虚，病难速已，名曰湿温。汗之则神昏耳聋，甚则目瞑不欲言；

下之则洞泄；润之则病深不解。长夏深秋冬日同法，三仁汤主之。

150. **答案：**E **解析：**黄芩滑石汤，出自《温病条辨》卷二。主治脉缓身痛，舌淡黄而滑，渴不多饮，或竟不渴，汗出热解，继而复热，内不能运水谷之湿，外复感时令之湿。

## 第三单元

1. **答案:** B 考点: 疟疾的辨证论治 (2014)  
解析: 疟疾分为正疟、温疟、寒疟、瘴疟、劳疟。正疟的临床特征为寒热休作有时; 温疟发作时热多寒少; 寒疟是热少寒多; 瘴疟分为热瘴和冷瘴, 热瘴表现为热盛寒微或壮热不寒, 冷瘴表现为寒盛热微或但热不寒; 劳疟发作时寒热较轻, 遇劳则发。
2. **答案:** D 考点: 疟疾的病因 (2013) 解析: 疟疾的发生主要是感受“疟邪”, 但其发病与正虚抗邪能力下降有关, 诱发因素则与外感风寒、暑湿、饮食劳倦有关, 其中尤以暑湿诱发为最多。
3. **答案:** A 考点: 疟疾的辨证论治 (2016)  
解析: 疟疾的治疗以祛邪截疟为基本治则, 根据寒热的偏盛又有不同的治疗原则, 温疟兼清, 寒疟兼温, 瘴疟宜解毒除瘴, 劳疟则扶正截疟, 疟母当祛瘀化痰软坚。
4. **答案:** D 考点: 水肿的辨证论治 (2015)  
解析: 水肿风水相搏证因风邪袭表, 肺气闭塞, 通调失职, 风遏水阻表现为眼睑浮肿, 继则四肢及全身皆肿, 来势迅速, 多有恶寒发热, 肢节酸楚, 小便不利等症。偏于风热者, 伴咽喉红肿疼痛, 舌质红, 脉浮滑数。偏于风寒者, 兼恶寒, 咳喘, 舌苔薄白, 脉浮滑或浮紧。
5. **答案:** D 考点: 淋证的辨证论治 (2016)  
解析: 淋证之气淋病机为气机郁结, 膀胱气化不利, 治宜理气疏导, 通淋利尿, 方用沉香散。小蓟饮子主治血淋, 补中益气汤主治劳淋, 八正散主治热淋, 程氏萆薢分清饮主治膏淋。
6. **答案:** C 考点: 淋证的辨证治法 (2014)  
解析: 石淋的病机为湿热蕴结下焦, 尿液煎熬成石, 膀胱气化失司。症见尿中夹砂石, 排尿涩痛, 或排尿时突然中断, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急, 往往突发, 一侧腰腹绞痛难忍, 甚则牵及外阴, 尿中带血, 舌红苔薄黄, 脉弦或带数。治宜清热利湿, 排石通淋。
7. **答案:** E 考点: 淋证的辨证论治 (2015)  
解析: 膏淋病机为湿热下注, 阻滞络脉, 脂

汁外溢, 治宜清热利湿, 分清泄浊, 方选程氏萆薢分清饮加减。小蓟饮子主治血淋, 补中益气汤主治劳淋, 八正散主治热淋, 石苇散主治石淋。

8. **答案:** C 考点: 郁证的辨证 (2016) 解析: 郁证的病因总属情志所伤, 发病与肝的关系最为密切, 其次涉及心、脾。肝失疏泄、脾失健运、心失所养、脏腑阴阳气血失调是郁证的主要病机, 故临床可见肝气郁结证, 气郁化火证, 痰气郁结证, 心神失养证, 心脾两虚证, 心肾阴虚证。

9. **答案:** B 考点: 郁证的辨证论治 (2013, 2016) 解析: 郁证痰气郁结证的病机为气郁痰凝, 阻滞胸咽, 治宜行气开郁, 化痰散结, 方选半夏厚朴汤加减。甘麦大枣汤主治郁证心神失养证; 柴胡疏肝散主治郁证肝气郁结证; 丹栀逍遥散主治郁证气郁化火证。

10. **答案:** D 考点: 郁证的辨证论治 (2014)  
解析: 《医宗金鉴·诸气治法》将郁证痰气郁结证称为“梅核气”, 表现为咽中如有物梗塞吞之不下, 咳之不出, 为气郁痰凝, 阻滞胸咽所致, 治宜行气开郁, 化痰散结, 方选半夏厚朴汤加减。

11. **答案:** D 考点: 紫斑的辨证论治 (2016)  
解析: 紫斑阴虚火旺证为虚火内炽, 灼伤脉络, 血溢肌肤, 治宜滋阴降火, 宁络止血, 方选茜根散加减。知柏地黄丸主治尿血肾虚火旺证; 无比山药丸主治尿血肾气不固证; 犀角地黄丸主治齿衄阴虚火旺证; 归脾汤主治脾不统血证。

12. **答案:** D 考点: 痰饮的分类 (2016) 解析: 饮邪具有流动之性, 饮留胃肠, 则为痰饮; 饮流胁下, 则为悬饮; 饮流肢体, 则为溢饮; 聚于胸肺, 则为支饮。

13. **答案:** C 考点: 痰饮的辨证论治 (2002, 2013) 解析: 病痰饮者, 当以温药和之, 故以温阳化饮为痰饮的基本治疗原则。

14. **答案:** C 考点: 消渴的辨证论治 (2016)  
解析: 胃热炽盛证见多食易饥, 口渴, 尿多, 形体消瘦, 大便干燥, 苔黄, 脉滑实有力, 为胃火内炽, 胃热消谷, 耗伤津液所致; 治宜清胃泻火, 养阴增液; 方用玉女煎加减。七味白术散主治消渴气阴两虚证; 消渴方主治消渴肺热津伤证; 茜根散主治紫斑阴虚火

旺证；清中汤主治胃痛湿热中阻证。

15.答案：A 考点：内伤发热的辨证论治

(2016)解析：阳虚发热的病机为肾阳虚衰，火不归原，治宜温补阳气，引火归原，方选金匮肾气丸加减。右归丸用于肾阳不足，命门火衰；中和汤主治内伤发热之痰湿郁热证；清骨散主治阴虚发热；归脾汤主治血虚发热。

16.答案：A 考点：痿证的病机 (2013) 解析：

痿证形成的原因颇为复杂，包括感受温毒、湿热浸淫、饮食毒物所伤、久病房劳、跌仆瘀阻等，致使精血津液亏损，不能束骨而利关节，以致肌肉软弱无力，消瘦枯萎，发为痿证，由此可见湿热邪气为痿证的主要病理因素。

17.答案：D 考点：颤证的病机 (2015) 解析：

颤证基本病机为肝风内动，筋脉失养。“肝主身之筋膜”，为风木之脏，肝风内动，筋脉不能自主，随风而动，牵动肢体及头颈颤抖摇动。其中又有肝阳化风、血虚生风、阴虚风动、瘀血生风、痰热动风等不同病机。

18.答案：A 考点：腰痛的辨证论治 (2014) 解析：

寒湿腰痛病机为寒湿痹阻，滞碍气血，经脉不利，治宜散寒行湿，温经通络，方选甘姜苓术汤加减。右归丸主治肾阳虚腰痛；独活寄生汤主治寒湿腰痛寒邪较甚者。

19.答案：A 考点：腰痛的辨证论治 (2013) 解析：

瘀血腰痛病机为瘀血阻滞，经脉痹阻，不通则痛，治宜活血化瘀，通络止痛，方选身痛逐瘀汤加减。独活寄生汤主治寒湿腰痛寒较盛者；甘姜苓术汤主治寒湿腰痛湿较盛者；人参养荣汤主治脾肺气虚证；血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。

20.答案：E 考点：常用耳穴的部位 (2014) 解析：

肝位于耳甲艇的后下部，即耳甲12区。盆腔位于三角窝后1/3的下部，即三角窝5区。内生殖器位于三角窝前1/3的下部，即三角窝2区。神门位于三角窝后1/3的下部，即三角窝4区。胰胆位于耳甲艇的后上部，即耳甲11区。

21.答案：E 考点：选穴原则 (2014) 解析：

近部取穴指在病变局部或距离比较近的范围选取穴位，是腧穴局部治疗作用的体现。远部取穴是在病变部位所属和相关的经络上，距病位比较远的部位的取穴，是“经络所

过，主治所及”的体现。膝眼位于髌韧带两侧凹陷处，迎香位于鼻旁，听宫位于耳屏前，睛明位于目内眦角稍内上方，均距病变部位较近，属近部取穴。足三里为胃经循行所过之处，距离病位较远，属远部取穴。

22.答案：A 考点：头痛的处方 (2015) 解析：

头痛治疗宜疏调经脉、通络止痛，按局部穴位和远端循经取穴为主，太阳经头痛为后枕部疼痛，天柱位于后枕部，属局部取穴，疏导头部经气，后溪，昆仑为远端循经取穴。

23.答案：C 考点：头痛的处方 (2013) 解析：

头痛的治法为调和气血，通络止痛，根据头痛部位循经取穴和取阿是穴为主。临床配伍血海、膈俞以活血通络止痛。

24.答案：C 考点：面痛的处方 (2015) 解析：

面痛的治法为疏通经络，祛风止痛。取手足阳明和足太阳经穴为主。主穴为攒竹、四白、下关、地仓、合谷、太冲、内庭。阴虚阳亢配风池、太溪。颧髻、迎香为上颌支痛的配穴；内关、三阴交为气血瘀滞的配穴；行间、内庭为肝胃郁热的配穴；曲池、外关为外感风热的配穴。

25.答案：B 考点：坐骨神经痛的处方 (2013) 解析：

坐骨神经痛的治法为通经止痛，循经取足太阳、足少阳经穴为主。疼痛以下肢外侧为主者，为足少阳经证，其主穴为腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟。

26.答案：A 考点：中风的治法 (2014) 解析：

中风中脏腑闭证，治疗宜平肝息风，醒脑开窍，取督脉、手厥阴及足太阳经穴为主。主穴为水沟、十二井、太冲、丰隆、劳宫。

27.答案：C 考点：中风的处方 (2011, 2013) 解析：

治疗中风中经络的主穴是水沟、内关、三阴交、极泉、尺泽、委中。太冲、丰隆、劳宫是治疗中风中脏腑闭证的主穴。关元、神阙是治疗中风中脏腑脱证的主穴。中风中经络痰热腑实配曲池、内庭、丰隆。

28.答案：E 考点：眩晕的处方 (2014) 解析：

眩晕虚证的治法为益气养血，填精定眩，以督脉穴及相应背俞穴为主。主穴为百会、风池、肝俞、肾俞、足三里。肝俞、肾俞滋补肝肾、益精填髓、固本培元；足三里补益气血；风池疏调头部气血，百会提升气血，二穴配合以充养脑髓而缓急治标。

29. **答案:** B 考点: 痢病的处方 (2014) 解析: 痢病发作期治法宜醒脑开窍, 以督脉及手厥阴经穴为主。主穴为水沟、百会、后溪、内关、涌泉。

30. **答案:** D 考点: 痛经的处方 (2014) 解析: 痛经虚证治疗宜调补气血、温养冲任, 以任脉、足太阴、足阳明经穴为主。三阴交为肝脾肾三经之交会穴, 可以健脾益气、调补肝肾, 肝脾肾精血充盈, 胞脉得养, 冲任自调; 气海为任脉穴, 可暖下焦, 温养冲任; 足三里补益气血。

31. **答案:** C 考点: 绝经前后诸证的处方 (2014) 解析: 绝经前后诸证治疗宜滋补肝肾、调理冲任, 以任脉、足太阴经穴及相关背俞穴为主。除气海为任脉穴, 可补益气血、调理冲任, 太溪滋补肝肾外, 三阴交为肝脾肾三经交会穴, 与肝俞、肾俞合用, 可调补肝肾。

32. **答案:** A 考点: 缺乳的处方 (2014 2015) 解析: 产后缺乳治疗宜调理气血、疏通乳络, 以足阳明、任脉穴为主。乳根可调理阴阳气血, 疏通乳络; 膻中为气会, 功在调气通络。少泽为通乳的经验效穴。

33. **答案:** A 考点: 遗尿的处方 (2013) 解析: 遗尿的治法为调理膀胱, 温肾健脾, 以任脉、足太阴经穴及相应的背俞穴、募穴为主。主穴为关元、中极、膀胱俞、三阴交。肾虚遗尿配肾俞、命门、太溪。取肾之背俞穴, 补养脏腑之气, 命门温补肾阳, 太溪为肾经输穴、原穴, 可温补肾之不足。

34. **答案:** C 考点: 颈椎病的处方 (2013) 解析: 颈椎病的治法为通经止痛。取局部腧穴和手足三阳经穴、督脉穴为主。主穴为颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟、阿是穴。

35. **答案:** D 考点: 颈椎病的处方 (2015) 解析: 颈椎病的治法为通经止痛, 取局部腧穴和手足三阳经穴、督脉穴为主。主穴为颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟、阿是穴。头晕头痛配百会或四神聪以疏通脉络, 提神醒脑。

36. **答案:** D 考点: 落枕的治法 (2013) 解析: 颈项侧部主要是由手三阳经和足少阳经所主, 手三阳经和足少阳经筋络受损, 气血阻滞为主要病机, 故落枕治疗宜疏筋通络、

活络止痛, 除阿是穴外, 还应以手太阳、足少阳经穴为主。

37. **答案:** A 考点: 扭伤的处方 (2013) 解析: 扭伤的治法为祛瘀消肿, 疏筋通络。取扭伤局部腧穴为主。踝部扭伤的主穴为阿是穴、申脉、解溪、丘墟。扭伤多为关节伤筋, 属经筋病, “在筋守筋”, 故治疗当以扭伤局部取穴为主, 以疏通经络, 散除局部的气血瘀滞, 配合循经远部取穴, 加强疏导本经气血的作用。

38. **答案:** C 考点: 肘劳的治法 (2014) 解析: 肘关节外上方即肱骨外上髁周围有明显的压痛点, 属手阳明经筋病证 (网球肘); 若肘关节内上方即肱骨内上髁周围有明显的压痛点, 属手太阳经筋病证 (高尔夫球肘); 若肘关节外部即尺骨鹰嘴处, 有明显的压痛点, 为手少阳经筋病证 (学生肘或矿工肘)。

39. **答案:** D 解析: 参照经络循行路线, 选择引经药, 从而提高疗效。如太阳头痛选用羌活、蔓荆子、川芎; 阳明头痛选用葛根、白芷、知母; 少阳头痛选用柴胡、黄芩、川芎; 厥阴头痛选用吴茱萸、藁本等。

40. **答案:** B 解析: 手阳明大肠经从手走头, 起于商阳, 止于迎香。与足阳明胃经相接, 共 20 个穴位, 体表部位主要循行于人体上肢的外侧。

41. **答案:** D 解析: 实记题。

42. **答案:** B 解析: 肺痈成痈期: ①主症: 身热转甚, 时时振寒, 继则壮热, 汗出烦躁, 咳嗽气急, 胸满作痛, 转侧不利。咳吐浊痰, 呈黄绿色, 自觉喉间有腥味, 口干咽燥, 舌苔黄腻, 脉滑数。②治法: 清肺解毒, 化痰消痈; ③代表方: 千金苇茎汤合如金解毒散加减。

43. **答案:** E 解析: 患者肺阴亏虚, 虚热内灼, 肺失润降, 则干咳; 虚火灼津为痰, 肺损络伤, 故痰少; 阴虚肺燥, 津液不能濡润上承, 则咳声嘶哑, 口干咽燥; 阴虚火旺, 故手足心热; 阴精不能充养而致形瘦神疲。结合舌脉表现, 本病属肺阴亏耗, 阴虚内热之咳嗽, 宜采用沙参麦冬汤治疗。

44. **答案:** D 解析: 根据题干所述, 判断为心血瘀阻型心悸。治法为活血化瘀, 理气通络。方药为桃仁红花煎。

45.答案: D 解析: 喘证表寒肺热证: ①主症: 喘逆上气, 胸胀或痛, 息粗, 鼻扇, 咳而不爽, 吐痰稠黏, 伴形寒, 身热, 烦闷, 身痛, 有汗或无汗, 口渴, 苔薄白或薄黄, 舌边红, 脉浮数或滑; ②治法: 解表清里, 化痰平喘; ③代表方: 麻杏石甘汤加减。

46.答案: C 解析: 肺胀阳虚水泛证: ①主症: 心悸, 喘咳, 咳痰清稀, 面浮, 下肢水肿, 甚则一身悉肿, 腹部胀满有水, 脘痞, 纳差, 尿少, 怕冷, 面唇青紫, 苔白滑, 舌胖质黯, 脉沉细; ②治法: 温肾健脾, 化饮利水; ③代表方: 真武汤合五苓散加减。

47.答案: D 解析: 考查清金化痰汤的效用。

48.答案: C 解析: 患者痰热壅肺, 肺失清肃, 肺气上逆, 故喘而气粗息涌, 痰鸣如吼, 胸高肋胀; 热蒸津聚生痰, 痰热交结, 故咳痰色黄, 痰火郁蒸, 则烦闷不安, 汗出面赤, 口渴喜饮。结合舌脉表现, 本病属于痰热内蕴之热哮, 宜采用清热宣肺, 化痰定喘的治疗方法。

49.答案: C 解析: 咳嗽痰湿蕴肺证: ①主症: 咳嗽反复发作, 咳声重浊, 痰多, 因痰而嗽, 痰出咳平, 痰黏腻或稠厚成块, 色白或带灰色, 每于早晨或食后则咳甚痰多, 进甘甜油腻食物加重, 胸闷, 脘痞, 呕恶, 食少, 体倦, 大便时溏, 舌苔白腻, 脉象濡滑; ②治法: 燥湿化痰, 理气止咳; ③方药: 二陈平胃散合三子养亲汤加减。

50.答案: B 解析: 心悸心虚胆怯证: ①主症: 心悸不宁, 善惊易恐, 坐卧不安, 不寐多梦而易惊醒, 恶闻声响, 食少纳呆, 苔薄白, 脉细略数或细弦; ②治法: 镇惊定志, 养心安神; ③代表方: 安神定志丸加减。

51.答案: A 解析: 不寐痰热扰心证: ①主症: 心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦, 头重, 目眩, 舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数; ②治法: 清化痰热, 和中安神; ③代表方: 黄连温胆汤加减。

52.答案: E 解析: 本题考察胸痹的临证加减, 本题属心肾阳虚证, 治当温补阳气, 振奋心阳。代表方为参附汤合右归饮加减。若肾阳虚衰, 不能制水, 水饮上凌心肺, 症见水肿, 喘促, 心悸, 用真武汤, 可加汉防己、猪苓、车前子温肾阳而化水饮。

53.答案: E 解析: 根据题干我们可以看出这是不寐里心胆气虚证, 用的方剂是安神定志丸合酸枣仁汤

54.答案: A 解析: 证属心悸心虚胆怯证, 治宜镇惊定志, 养心安神。

55.答案: B 解析: 根据题干所述诊断为不寐心肾不交证

56.答案: B 解析: 突然昏仆, 不省人事, 牙关紧闭, 两手握固, 大小便闭, 肢体强痉, 伴有静卧不烦, 四肢不温, 痰涎壅盛, 舌苔白腻, 脉沉滑缓为中风阴闭证

57.答案: B 解析: 实记题。

58.答案: A 解析: 心脾两虚证: ①主症: 反复发作, 神疲乏力, 心悸气短, 失眠多梦, 面色苍白, 体瘦纳呆, 大便溏薄, 舌质淡, 苔白腻, 脉沉细而弱; ②治法: 补益气血, 健脾宁心; ③代表方: 六君子汤合归脾汤加减。

59.答案: A 解析: 证属饮食停滞之胃痛, 其食积以中焦胃为主, 治疗当以消食和胃为优。枳实导滞丸病位偏于食积在肠, 治疗导滞为主, 故可除外; 调胃承气汤、小承气汤以通腑为主, 非消食和胃之剂; 越鞠丸治疗多种病理之郁, 非单一食积所宜。

60.答案: B 解析: 实记题。

61.答案: B 解析: 根据题干, 诊断为鼓胀水热蕴结证。

62.答案: A 解析: 胁痛肝胆湿热证: ①主症: 胁肋胀痛或刺痛, 口苦口黏, 胸闷纳呆, 恶心呕吐, 小便黄赤, 大便不爽, 或兼有身热恶寒, 身目发黄, 舌红苔黄腻, 脉弦滑数; ②治法: 清热利湿; ③代表方: 龙胆泻肝汤加减。

63.答案: D 解析: 小便频数短涩、滴沥刺痛、欲出未尽、小腹拘急, 为诸淋所共有。血淋鉴别要点是溺血而痛; 而热淋的特征是小便灼热刺痛; 石淋的特征是以小便排出砂石为主症; 气淋的特征是少腹胀满较为明显, 小便艰涩疼痛, 尿有余沥; 劳淋特征是小便淋漓不已, 遇劳而发。

64.答案: D 解析: 热淋证候: 小便频数短涩, 灼热刺痛, 溺色黄赤, 少腹拘急胀痛, 或有寒热, 口苦, 呕恶, 或有腰痛拒按, 或有大便秘结, 苔黄腻, 脉滑数。治法: 清热利湿通淋。方药: 八正散加减。

65.答案：A 解析：本题所提供的病例，缘于长期饮酒所致，酒为辛热之物，积久成毒伤及胃腑，热迫胃络，血从口出，故应诊为胃热壅盛之吐血。故选 A。

66.答案：C 解析：根据题干，考虑为痫病。治宜醒脑开窍。针灸时以手厥阴经、督脉及足少阴经穴为主。

67.答案：B 解析：根据题干，诊断为痹证之行痹(风痹)。治宜通痹止痛。以病痛局部穴为主，结合循经及辨证选穴。主穴为阿是穴、局部经穴。行痹者，加膈俞、血海。

68.答案：B 解析：根据题干，诊断为消渴病肾阴亏虚，属下消。治宜清热润燥，养阴生津。针灸时下消取足少阴、足厥阴经为主。主穴为胰俞、肺俞、脾俞、肾俞、太溪、三阴交。下消者，加复溜、太冲。

69.答案：E 解析：患者产后乳汁乳少，乳房胀满疼痛，身有微热，脘痞食少，舌红，苔薄黄，为肝气郁滞。治宜调理气血，疏通乳络。取取足阳明、任脉经穴为主。

70.答案：A 解析：带下病的处方：①主穴为带脉、中极、白环俞、阴陵泉；②配穴为湿热下注者，加水道、次髎；脾气虚者，加气海、足三里、三阴交；肾虚者，加关元、肾俞、照海；阴痒者，加蠡沟、中都、太冲；带下色红者，加间使；腰部酸痛者，加腰眼、小肠俞；纳少便溏者，加中脘、天枢。

71.答案：B 解析：根据题干所述，综合考虑为脾胃湿热证。以健脾祛湿，“肚腹三里留”，足三里健中养血，温中实脾，天枢为大肠之募穴，可祛湿热。

72.答案：E 解析：患者产后乳汁乳少，乳房胀满疼痛，身有微热，脘痞食少，舌红，苔薄黄，为肝气郁滞。治宜调理气血，疏通乳络。取取足阳明、任脉经穴为主。

73.答案：D 解析：遗尿的治法为健脾益气，温肾固摄。针灸时取任脉、足太阴经穴、相应背俞穴为主。

74.答案：E 解析：本证胃痛属阴虚，治以足太阴、阳明经穴为主，中脘为胃募，足三里为胃经下合穴，三阴交为脾经穴，共奏和胃止痛之功，内庭胃之荥穴，泄胃中郁火。

75.答案：A 解析：痛痹久延，致阳气衰惫，取关元、肾俞以益火之原，振奋阳气而驱散

寒邪。B 为着痹配穴，C 为热痹配穴，E 为行痹配穴。

76.答案：D 解析：热结便秘，取合谷、内庭泻大肠腑气以泄其热。B 为气滞便秘配穴，C 为寒秘配穴，E 为气血虚弱便秘配穴。

77.答案：A 解析：风火郁于少阳、厥阴，取肝经行间、大敦、胆经阳陵泉清厥阴郁火，疏散少阳风邪。

78.答案：B 解析：风池祛风散寒、舒筋活络，合谷祛在表之风邪，故取之。

79.答案：E 解析：本证风热感冒治以散风热、清肺气。取肺经荥穴鱼际，配合尺泽清泄肺热。太阴、阳明相表里，取阳明经穴曲池以清热保津治口渴。

80.答案：D 解析：本证急性泄泻，治以疏调肠胃气机为主，取大肠募穴天枢、下合穴上巨虚调整胃肠之运化与传导功能。脾与胃相表里，取阴陵泉疏调脾经经气，水精四布，小溲通利，则湿滞化而大便转实。

81.答案：B 解析：略

82.答案：C 解析：略

83.答案：A 解析：略

84.答案：C 解析：略

85.答案：A 解析：略

86.答案：D 解析：略

87.答案：D 解析：证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。

88.答案：B 解析：证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。

89.答案：A 解析：证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。

90.答案：E 解析：证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。

91.答案：A 解析：胃痛脾胃虚寒证：患者胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，劳累或受凉后发作或加重，泛吐

清水，纳差，神疲乏力，甚则手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。治法：温中健脾，和胃止痛。

92.答案：A 解析：胃痛脾胃虚寒证可用黄芪建中汤：黄芪、白芍、桂枝、炙甘草、生姜、大枣、饴糖为主方进行治疗。方中黄芪益气补中；小建中汤温脾散寒，缓急止痛。胃脘冷痛，里寒较甚，呕吐，肢冷，可加理中丸以温中散寒。

93.答案：C 解析：痛止之后，可用香砂六君子汤：木香、砂仁、陈皮、半夏、党参、白术、茯苓、甘草调理。故本题选 C。

94.答案：C 解析：略

95.答案：D 解析：略

96.答案：C 解析：略

97.答案：E 解析：根据患者临床症状诊断为积证气滞血阻证

98.答案：C 解析：略

99.答案：E 解析：略

100.答案：D 解析：略

101.答案：A 解析：略

102.答案：C 解析：略

103.答案：C 解析：略

104.答案：B 解析：略

105.答案：D 解析：略

106.答案：E 解析：略

107.答案：C 解析：略

108.答案：E 解析：略

109.答案：B 解析：略

110.答案：D 解析：略

111.答案：E 解析：2.胸部经络循行距正中线 第一侧线肾经 2 寸，第二侧线胃经 4 寸，第三侧线脾经 6 寸。腹部经络循行距正中线：第一侧线肾经 0.5 寸，第二侧线胃经 2 寸。

112.答案：C 解析：2.胸部经络循行距正中线 第一侧线肾经 2 寸，第二侧线胃经 4 寸，第三侧线脾经 6 寸。腹部经络循行距正中线：第一侧线肾经 0.5 寸，第二侧线胃经 2 寸。

113.答案：C 解析：冲脉 上至头，下至足，贯串全身，成为气血的要冲，能调节十二经气血，故有'十二经脉之海'之称，故选 C。任脉有调节月经，妊养胎儿的作用，故有'任主胞胎'之说。

114.答案：B 解析：冲脉 上至头，下至足，

贯串全身，成为气血的要冲，能调节十二经气血，故有'十二经脉之海'之称，故选 C。任脉有调节月经，妊养胎儿的作用，故有'任主胞胎'之说。

115.答案：A 解析：肺主气司呼吸，肾为气之根，主摄纳。肺肾气虚降纳无权，气不归元，故咳喘，乏力少气，呼多吸少，自汗耳鸣，舌淡脉弱；心气虚，鼓动无力，肺主气司呼吸，心肺气虚可见咳喘，胸闷心悸，乏力少气，自汗声低，舌淡脉弱。

116.答案：D 解析：肺主气司呼吸，肾为气之根，主摄纳。肺肾气虚降纳无权，气不归元，故咳喘，乏力少气，呼多吸少，自汗耳鸣，舌淡脉弱；心气虚，鼓动无力，肺主气司呼吸，心肺气虚可见咳喘，胸闷心悸，乏力少气，自汗声低，舌淡脉弱。

117.答案：D 解析：略

118.答案：A 解析：略

119.答案：A 解析：大杼为骨会，绝骨为髓会，太渊为脉会，膈俞为血会，膻中为气会。

120.答案：C 解析：大杼为骨会，绝骨为髓会，太渊为脉会，膈俞为血会，膻中为气会。

121.答案：D 解析：中脘为胃之募穴，加胃经合穴足三里可奏理气和胃之功，内关有宣通上中二焦气机作用。合用治胃腑疾病。

122.答案：D 解析：中脘为胃之募穴，加胃经合穴足三里可奏理气和胃之功，内关有宣通上中二焦气机作用。合用治胃腑疾病。

123.答案：D 解析：1.经筋作用主要是约束骨骼，利于关节屈伸以保持人体正常的运动功能。2.十二经别是十二正经离入出合的别行部分。

124.答案：C 解析：1.经筋作用主要是约束骨骼，利于关节屈伸以保持人体正常的运动功能。2.十二经别是十二正经离入出合的别行部分。

125.答案：D 解析：1.隔盐灸有回阳、救逆、固脱之力。2.隔姜灸常用于因寒而致呕吐、腹痛、腹泻及风寒痹痛等。

126.答案：B 解析：1.隔盐灸有回阳、救逆、固脱之力。2.隔姜灸常用于因寒而致呕吐、腹痛、腹泻及风寒痹痛等。

127.答案：A 解析：痴呆髓海不足用七福饮补肾益髓，填精养神。脾肾两虚用还少丹温

补脾肾。肾阴虚火旺用知柏地黄丸。肾阴不足用河车大造丸滋阴补肾。故 1 选 A, 2 选 B。考点: 痴呆的分证治疗

128.答案: B 解析: 痴呆髓海不足用七福饮补肾益髓, 填精养神。脾肾两虚用还少丹温补脾肾。肾阴虚火旺用知柏地黄丸。肾阴不足用河车大造丸滋阴补肾。故 1 选 A, 2 选 B。考点: 痴呆的分证治疗

129.答案: A 解析: 气厥只有气机逆乱, 实证特点是口噤握拳, 呼吸气粗, 虚证特点是面白肢冷, 呼吸微弱。血厥还有血菀于上, 实证表现为面赤唇紫, 头晕胀痛, 虚证表现为口唇不华, 四肢震颤。故 3 选 A, 4 选 B。考点: 厥证的分型特点

130.答案: B 解析: 气厥只有气机逆乱, 实证特点是口噤握拳, 呼吸气粗, 虚证特点是面白肢冷, 呼吸微弱。血厥还有血菀于上, 实证表现为面赤唇紫, 头晕胀痛, 虚证表现为口唇不华, 四肢震颤。故 3 选 A, 4 选 B。考点: 厥证的分型特点

131.答案: B 解析: 痞满饮食内停用保和丸消食导滞, 行气除痞。肝胃不和用越鞠丸合枳术丸疏肝解郁, 理气消痞。痰湿内阻用二陈平胃散除湿化痰, 理气和中。脾胃虚弱用香砂六君子汤补气健脾, 行气消痞。湿热食积用枳实导滞丸消食导滞, 清热祛湿。故 3 选 B, 4 选 C。考点: 痞满的分证治疗。

132.答案: C 解析: 痞满饮食内停用保和丸消食导滞, 行气除痞。肝胃不和用越鞠丸合枳术丸疏肝解郁, 理气消痞。痰湿内阻用二陈平胃散除湿化痰, 理气和中。脾胃虚弱用香砂六君子汤补气健脾, 行气消痞。湿热食积用枳实导滞丸消食导滞, 清热祛湿。故 3 选 B, 4 选 C。考点: 痞满的分证治疗。

133.答案: B 解析: 2.腹部时有条索状物聚起--聚证; 腹胀, 纳呆, 舌苔腻, 脉弦滑--食滞、痰浊交阻, 气聚不散, 结而成块, 即聚证之食滞痰阻, 治法: 理气化痰, 导滞散结, 六磨汤主之。腹部积块明显, 质地较硬--积证; 固定不移, 刺痛, 面色晦暗黧黑, 舌质紫, 脉细涩--瘀血, 即积证之瘀血内结以祛瘀软坚, 扶正健脾为法, 方用膈下逐瘀汤合六君子汤加减。

134.答案: D 解析: 2.腹部时有条索状物聚

起--聚证; 腹胀, 纳呆, 舌苔腻, 脉弦滑--食滞、痰浊交阻, 气聚不散, 结而成块, 即聚证之食滞痰阻, 治法: 理气化痰, 导滞散结, 六磨汤主之。腹部积块明显, 质地较硬--积证; 固定不移, 刺痛, 面色晦暗黧黑, 舌质紫, 脉细涩--瘀血, 即积证之瘀血内结以祛瘀软坚, 扶正健脾为法, 方用膈下逐瘀汤合六君子汤加减。

135.答案: A 解析: 2.邪壅经络用羌活胜湿汤祛风散寒、燥湿和营; 肝经热盛用羚角钩藤汤清肝潜阳, 息风止痉。

136.答案: D 解析: 2.邪壅经络用羌活胜湿汤祛风散寒、燥湿和营; 肝经热盛用羚角钩藤汤清肝潜阳, 息风止痉。

137.答案: C 解析: 湿热在肠, 传导失常, 故腹痛, 泻下急迫。气味臭秽, 肛门灼热, 烦热口渴, 都是湿热互结的表现。治宜清热利湿, 用葛根芩连汤。寒湿留滞肠中, 气机阻滞, 故腹痛拘急, 里急后重; 只伤及气分, 故痢下赤白黏冻, 白多赤少; 寒湿困脾, 故脘腹胀满, 舌苔白腻, 脉濡缓。治宜温化寒湿, 调气和血。用不换金正气散。考点: 湿热泄泻和寒湿痢疾的治疗

138.答案: B 解析: 湿热在肠, 传导失常, 故腹痛, 泻下急迫。气味臭秽, 肛门灼热, 烦热口渴, 都是湿热互结的表现。治宜清热利湿, 用葛根芩连汤。寒湿留滞肠中, 气机阻滞, 故腹痛拘急, 里急后重; 只伤及气分, 故痢下赤白黏冻, 白多赤少; 寒湿困脾, 故脘腹胀满, 舌苔白腻, 脉濡缓。治宜温化寒湿, 调气和血。用不换金正气散。考点: 湿热泄泻和寒湿痢疾的治疗

139.答案: B 解析: 积聚是正气亏虚、脏腑失和, 气滞、血瘀、痰浊蕴结于腹, 引发腹内结块, 或胀或痛为主要临床特征的病证, 病机是气机阻滞, 瘀血内结。臌胀是肝脾肾三脏受损, 气、血、水瘀积腹内, 以腹部膨大如鼓、皮色苍黄、腹壁脉络暴露为特征, 或有肋下或腹部痞块, 四肢枯瘦表现的病证, 病机是肝脾肾受损, 气滞血结, 水停腹中。C、D 的脏腑定位不完全准确。E 的病理因素不全面。考点: 积聚和膨胀的病机鉴别

140.答案: A 解析: 积聚是正气亏虚、脏腑失和, 气滞、血瘀、痰浊蕴结于腹, 引发腹

内结块，或胀或痛为主要临床特征的病证，病机是气机阻滞，瘀血内结。臌胀是肝脾肾三脏受损，气、血、水瘀积腹内，以腹部胀大如鼓、皮色苍黄、腹壁脉络暴露为特征，或有肋下或腹部痞块，四肢枯瘦表现的病证，病机是肝脾肾受损，气滞血结，水停腹中。C、D的脏腑定位不完全准确。E的病理因素不全面。考点：积聚和膨胀的病机鉴别

141.答案：A 解析：略

142.答案：D 解析：略

143.答案：E 解析：略

144.答案：B 解析：略

145.答案：C 解析：略

146.答案：D 解析：考点：泄泻的辨证论治(2014)

147.答案：C 解析：略

148.答案：A 解析：考点：十二经脉的交接规律(2014)

149.答案：D 解析：解析：针灸治疗崩漏实证应选取关元、公孙、隐白、三阴交通调冲任，驱邪固经；针灸治疗崩漏虚证应选取三阴交、足三里、气海调补冲任，益气固经。

150.答案：A 解析：针灸治疗崩漏实证应选取关元、公孙、隐白、三阴交通调冲任，驱邪固经；针灸治疗崩漏虚证应选取三阴交、足三里、气海调补冲任，益气固经

## 第四单元

1. **答案:** C 解析:《外科正宗》系由明代陈实功编著的一本外科专著,成书于1617年。
2. **答案:** A 解析:后世对《外科正宗》的评价甚高,《四库全书总目提要》评为:“列证最详,论治最精”。
3. **答案:** D 解析: a: 直肠下部、直肠前壁、身体矮小肥胖者; b: 肛门直肠手术; c: 常用检查与治疗; d: 2、3期内痔、脱肛、息肉痔; e: 肛门直肠手术
4. **答案:** E 解析: 肿是由各种致病因素引起的经络阻隔,气血凝滞而成的。但由于患者的体质强弱与致病原因不同,发生肿的外在表现也有差异。气血两虚不能托毒外出或不能约束毒邪的蔓延,因此说“虚”是肿势平坦,根盘散漫的成因。
5. **答案:** B 解析: 略
6. **答案:** C 解析: 辨脓的方法有点压法、透光法、穿刺法、接触法及B超。
7. **答案:** C 解析: 实记题。
8. **答案:** C 解析: 皮肤病根据病情阶段使用外用药的具体原则:①皮肤炎症在急性阶段若仅有红斑、丘疹、水疱而无渗液,宜用洗剂、粉剂、乳剂;②若有大量渗液或明显红肿,则用溶液湿敷为宜;③皮肤炎症在亚急性阶段,渗液与糜烂很少,红肿减轻,有鳞屑和结痂,则用油剂为宜;④皮肤炎症在慢性阶段,有浸润肥厚、角化过度时,则用软膏为主。
9. **答案:** E 解析: 托法分为补托法和透托法。补托法适用于正虚毒盛,不能托毒外达,疮形平塌,根脚散漫,难溃难腐的虚证。透托法适用于毒气盛而正气未衰者,可用透脓的药物,促其早日脓出毒泄,肿消痛减,以免脓毒旁窜深溃。
10. **答案:** C 解析: 发于颜面部的疔疮易走黄而发生生命危险,颧疔发于面部。
11. **答案:** C 解析: 发于颜面部的疔疮易走黄而发生生命危险,颧疔发于面部。
12. **答案:** D 解析: 烂疔易出现‘胀裂样’特殊疼痛

13. **答案:** A 解析: 略
14. **答案:** B 解析: a: 单双侧乳晕中央有扁圆形肿块; b: 乳房有形状大小不一的肿块疼痛(胀痛),与月经周期相关; c: 乳房红肿疼痛,乳汁排出不畅,伴全身发热; d: 无热、无痛、皮色不变、质地坚硬的肿块,推之不移; e: 结块如桃李,边界不清,脓稀夹有豆渣样物
15. **答案:** B 解析: a: 冲任失调; b: 痰凝; c: 痰火郁结; d: 气虚血瘀; e: 肝郁气滞
16. **答案:** D 解析: 甲状腺炎,历代文献中无确切病名,根据特点,定名为癭瘤
17. **答案:** C 解析: a: 体表血络扩张,纵横丛集而形成,色泽鲜红或暗紫,触之如海绵状; b: 以筋脉色紫、盘曲突起如蚯蚓状、形成团块; c: 皮肤间发生柔软肿核,按之凹陷,放手凸起,状若有气; d: 肉瘤是发于皮里膜外、由脂肪组织过度增生而形成的良性肿瘤。其特点是软似棉,肿似馒,皮色不变,不紧不宽,如肉之隆起。相当于西医的脂肪瘤。; e: 以肿块坚硬如石,紧贴于骨,推之不移
18. **答案:** E 解析: 婴儿湿疹,由于秉性不耐,脾胃运化失职,内有胎火湿热,外受风湿热邪,两者蕴阻肌肤而成。或因消化不良、食物过敏、衣服摩擦、肥皂水洗涤刺激等而诱发。
19. **答案:** B 解析:《达生篇》六字真言:一日睡;二日忍痛;三日慢临盆。
20. **答案:** A 解析: 子宫的功能主要是产生、排出月经;孕育、分娩胎儿。另外还有排出余血浊液、分泌生理性带下的功能。精子进入输卵管也必须通过子宫。
21. **答案:** C 解析: 性成熟一般自18岁左右开始,历时约30年。
22. **答案:** C 解析: 根据患者临床表现诊断为带下过多脾虚证。治宜健脾益气,升阳除湿。故应选完带汤
23. **答案:** B 解析: 医学上规定,以末次月经的第一天起计算预产期,其整个孕期共为280天,10个妊娠月(每个妊娠月为28天、即40周)。将最后一次月经来潮的月份减掉3(不足者加上9)或月份直接加9也可,日数加上7,即为预产期。

24. **答案:** B 解析: 惊恐伤肾, 每使气下, 可致月经过多、闭经、崩漏、胎动不安、不孕等病证。

25. **答案:** E 解析: 对妊娠脉的论述, 始于《内经》, 《素问·阴阳别论》“阴搏阳别, 谓之有子”, 《素问·平人气象论》“手少阴脉动甚者, 妊子也”。现代医家认为, 身有病而无邪脉, 尺脉按之不绝, 在妊娠 30~40 天就出现。出现六部脉充盈滑利流畅。此时, 各种妊娠征象已较明显, 判断妊娠应当没有困难。到 60~90 天及以后, 两尺脉尤其充盈滑利, 更加显而易见, 与寸脉比较, 也已经明显不同。

26. **答案:** A 解析: 月经将至或正值月经期脉多显滑象, 为月经常脉。

27. **答案:** A 解析: 月经先期的病因主要是气虚和血热。气虚则统摄无力, 冲任不固; 血热则热伏冲任, 伤及子宫, 血海不宁, 均可使月经先期而至。

28. **答案:** B 解析: 带下过多的病因包括脾虚、肾阳虚、阴虚夹湿、湿热下注、热毒蕴结; 带下过少的病因主要有肝肾亏损、血枯瘀阻。

29. **答案:** D 解析: 月经先后无定期的病因主要的肝、肾功能失调, 冲任功能紊乱, 血海蓄溢失常, 其病因为肝郁、肾虚。

30. **答案:** C 解析: 月经过多气虚证的主要症状是经行量多, 色淡红, 质清稀; 神疲肢倦, 气短懒言, 小腹空坠, 面色晄白; 舌淡, 苔薄, 脉细弱。故其月经特点是量多, 色淡红, 质清稀。

31. **答案:** B 解析: 妇人下腹结块, 伴有或胀、或痛、或满、或异常出血者, 称为癥瘕。

32. **答案:** D 解析: 慢性盆腔炎在临床根据病变特点及部位的不同, 分别称为慢性输卵管炎、输卵管积水、输卵管卵巢炎、输卵管卵巢囊肿、慢性盆腔结缔组织炎。

33. **答案:** B 解析: 本病的主要病机是阴液不足, 不能渗润阴道。肝肾亏损、血枯瘀阻是导致带下过少的主要原因。所以治疗以滋阴为主。

34. **答案:** A 解析: 内补丸能温肾培元, 固涩止带。用于治疗肾虚带下病。

35. **答案:** E 解析: 放置宫内节育器的禁忌

证是: ①妊娠或可疑妊娠者; ②生殖器官炎症, 如急、慢性盆腔炎、阴道炎、宫颈急性炎症和宫颈重度糜烂者; ③月经紊乱、月经过多或不规则阴道出血、重度痛经者; ④生殖器官肿瘤, 如子宫肌瘤、卵巢囊肿慎用; ⑤生殖器官畸形, 如子宫纵隔、双子宫等; ⑥严重的全身性疾病, 如心力衰竭、重度贫血、血液病和各种疾病的急性期; ⑦子宫颈口松弛、严重的子宫脱垂妇女。

36. **答案:** D 解析: 卵巢的内分泌功能是分泌女性激素。

37. **答案:** A 解析: 怀孕前三个月

38. **答案:** A 解析: 根据最新大纲:  $7 \sim 12$  个月婴儿体重 =  $6 + 0.25 \times$  月龄

39. **答案:** A 解析: 不属于小儿正常断奶季节是酷暑、严冬

40. **答案:** D 解析: 尽量给予母乳喂养, 喂足奶量

41. **答案:** C 解析: 记忆: 硬肿症内因——肾阳虚衰

42. **答案:** C 解析: 肺炎喘嗽: 肺部听诊可闻及中、细湿啰音

43. **答案:** C 解析: 兼夹肺虚痰湿: 二陈汤、三拗汤

兼夹脾虚食积: 保和丸

兼夹肝热惊风: 镇惊丸

44. **答案:** E 解析: 鹅口疮

心脾积热: 清热泻脾散

虚火上浮: 知柏地黄丸

45. **答案:** E 解析: 长期应用抗生素或肾上腺皮质激素辅助治疗者, 尽可能暂停使用

46. **答案:** A 解析: 夜啼-脾寒气滞: 乌药散合匀气散

心经积热: 导赤散

惊恐伤神: 远志丸

47. **答案:** D 解析: 汗证-肺卫不固: 玉屏风散合牡蛎散

营卫失调: 黄芪桂枝五物汤

气阴亏虚: 生脉散、当归六黄汤

湿热迫蒸: 泻黄散

48. **答案:** A 解析: 五迟五软中, 立迟、行迟、齿迟、头项软、手软、足软主要的病机是肝肾脾不足, 而语迟、发迟、肌肉软、口软主要在于心脾不足。

49. **答案:** D 解析: 急性肾小球肾炎的临床特征是血尿、蛋白尿、水肿、高血压及全身症状等。

50. **答案:** B 解析: 治疗脾肾气虚型尿频宜温补脾肾, 升提固摄, 故选用的方剂为缩泉丸。

51. **答案:** D 解析: 小儿汗证以虚证为主

52. **答案:** D 解析: 麻疹一年四季都有发生, 但好发于冬、春二季, 且常引起流行。发病年龄以 6 个月至 5 岁为多。

53. **答案:** A 解析: 手足口病主要表现为口腔及手足部发生疱疹。口腔疱疹多发生在硬腭、颊部、齿龈、唇内及舌部, 破溃后形成小的溃疡, 疼痛较剧, 婴幼儿常表现烦躁、哭闹、流涎、拒食等。在口腔疱疹出现后 1~2 天可见皮肤斑丘疹, 呈离心性分布, 以手足部多见, 并很快变为疱疹, 疱疹呈圆形或椭圆形扁平凸起, 如米粒至豌豆大, 质地较硬, 多不破溃, 内有混浊液体, 周围绕以红晕。疱疹长轴与指、趾皮纹走向一致。少数患儿臂、腿、臀等部位也可出现疱疹, 但躯干及颜面部极少。疱疹一般 7~10 天消退, 消退后无瘢痕及色素沉着。

54. **答案:** C 解析: 蛲虫病是小儿常见的寄生虫病。传染途径与蛔虫相同, 虫体如线头样, 易黏附在肛门周围, 肛门及会阴部瘙痒, 夜间尤为明显。

55. **答案:** B 解析: 疖的特点是突起根浅, 肿势局限, 范围在 3cm 左右, 易脓, 易溃, 易敛

56. **答案:** A 解析: 疔疮中影响手指关节伸曲的为蛇肚疔

57. **答案:** B 解析: 肿块发于臀部, 有肌肉注射史, 且肿块中心为著, 边界不清, 灼热疼痛, 是为臀痈

58. **答案:** B 解析: 发于颈部, 形如鸡卵, 边界清楚, 是为颈痈。内治治法为清热散风, 化痰消肿, 方选牛蒡解肌汤或银翘散加减。

59. **答案:** B 解析: A. 溃孔较深 c、d、e: 红肿热痛

60. **答案:** A 解析: 青春期前异常发育

61. **答案:** A 解析: 1、瘰疬二证: 风热痰凝证、气滞痰凝证

62. **答案:** E 解析: 1、质地柔软易出血,

无疼痛: 血瘤 2、血瘤三证: 心肾火毒、肝火、脾虚

3、纳呆便溏: 脾虚, 不能统血

4、血瘤脾虚证: 顺气归脾丸

63. **答案:** A 解析: 圆癣相当于西医的体癣, 以青壮年男性多见, 多发于夏季, 好发于面部、躯干及四肢近端。皮损呈圆形, 或多环形, 类似钱币状, 为边界楚、中心消退、外周扩张的斑块。紫白癜风相当于西医的花斑癣, 俗称汗斑, 常发于多汗体质青年, 可在家庭中相互传染。白秃疮相当于西医的白癣, 属头癣的一种, 多见于学龄儿童, 男性多于女性。皮损特点是头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片, 病损区毛发干枯无泽。鹅掌风相当于西医的手癣, 以成年人多见, 男女老幼均可染病, 多为单侧发病。肥疮相当于西医的黄癣, 为头癣中最常见的一种, 好发于儿童, 皮损多从头顶开始。

64. **答案:** C 解析: 有外口: 判断为肛痿 2、多处外口: 复杂肛漏

一个外口: 单纯肛漏

3、高位肛痿: 痿管位于外括约肌深部以上  
低位肛痿: 痿管位于外括约肌深部以下  
(齿线位于外括约肌深部以下)

综上三点, 为低位单纯肛漏

65. **答案:** B 解析: 1、结石疾病发作——剧痛。故排除

66. **答案:** A 解析: 根据该题描述情况, 患者应考虑疑似异位妊娠, 故须行血 hCG、B 超、诊断性刮宫、阴道后穹窿穿刺等检查, 而选项 A 测定基础体温仅用于指导避孕和受孕, 协助诊断月经失调和协助诊断妊娠。

67. **答案:** D 解析: 根据该题主要症状的描述, 该患者属于经行乳房胀痛肝肾亏虚证, 故其治法是滋肾养肝, 和胃通络。

68. **答案:** A 解析: 根据主要症状的描述, 该患者属于经断复来肾阴虚证, 故其治疗首选方剂是知柏地黄汤。

69. **答案:** E 解析: 根据患者临床表现诊断为带下过少肝肾亏损证。治宜滋补肝肾, 养精益血。宜选方药为左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬。

70. **答案:** C 解析: 由题干停经 2 个月, 尿妊娠试验阳性、恶心、呕吐 10 天, 辨病为

妊娠恶阻。由不能进食，呕吐血水，精神萎靡，头晕体倦，可知是脾胃虚弱证的妊娠恶阻。治宜健脾和胃，降逆止呕，方选香砂六君子汤。

71. **答案:** C 解析: 根据题干, 诊断为产后腹痛瘀滞子宫证。治宜活血化瘀 温经止痛。可选生化汤。

72. **答案:** D 解析: 产后 4 周恶露不止, 属产后恶露不绝; 根据恶露量、色、质及伴随症状、舌脉, 属气虚证。

73. **答案:** D 解析: 题干描述的是急性盆腔炎湿热瘀结证的主要症状, 其治法为清热利湿, 化瘀止痛, 首选治疗方剂是仙方活命饮加薏苡仁、冬瓜仁。

74. **答案:** A 解析: 人流不全的诊断要点是人流术后阴道持续或间断出血超过 10 天, 或出血量大于月经量, 夹有黑色血块或烂肉样组织; 人流术后腰痛, 有下坠感, 常在阵发性腹痛后阴道出血增加, 或夹有血块。故根据该题描述, 考虑诊断为人流不全。

75. **答案:** C 解析: 基础体温测定是了解卵巢功能最简便的方法。

76. **答案:** B 解析: 略

77. **答案:** B 解析: 略

78. **答案:** E 解析: 略

79. **答案:** C 解析: 略

80. **答案:** D 解析: 略

81. **答案:** C 解析: 略

82. **答案:** A 解析: 略

83. **答案:** C 解析: 略

84. **答案:** E 解析: 略

85. **答案:** C 解析: 略

86. **答案:** E 解析: 略

87. **答案:** E 解析: 略

88. **答案:** C 解析: 略

89. **答案:** C 解析: 略

90. **答案:** D 解析: 略

91. **答案:** E 解析: 略

92. **答案:** E 解析: 略

93. **答案:** B 解析: 略

94. **答案:** E 解析: 略

95. **答案:** E 解析: 略

96. **答案:** C 解析: 略

97. **答案:** C 解析: 略

98. **答案:** D 解析: 略

99. **答案:** D 解析: 略

100. **答案:** D 解析: 略

101. **答案:** A 解析: 略

102. **答案:** C 解析: 略

103. **答案:** A 解析: 略

104. **答案:** C 解析: 略

105. **答案:** C 解析: 略

106. **答案:** B 解析: 略

107. **答案:** C 解析: 哮喘以临床反复发作, 发作时喘粗气急, 喉间哮鸣, 严重者呼吸困难, 张口抬肩, 摇身撷肚为主要特征。根据患儿表现诊断为哮喘。

108. **答案:** D 解析: 该患儿可诊断为哮喘发作期, 咯痰清稀色白, 呈泡沫状, 形寒无汗, 口不渴, 小便清长, 大便溏薄, 咽不红, 舌质淡红, 苔白滑, 脉浮紧, 均为风寒束肺之象, 治法为温肺散寒, 涤痰定喘。

109. **答案:** B 解析: 寒性哮喘方用小青龙汤合三子养亲汤, 热性哮喘用麻杏石甘汤合苏葶丸, 哮喘外寒内热证用大青龙汤。

110. **答案:** A 解析: 略

111. **答案:** E 解析: 略

112. **答案:** C 解析: 略

113. **答案:** C 解析: 实记题。

114. **答案:** A 解析: 实记题。

115. **答案:** A 解析: 本题表述为阳证, 系因火热湿毒郁结局部, 造成气血淤滞的病理变化, 故而红肿疼痛。金黄膏功能清热除湿, 散瘀化痰, 止痛消肿, 为治疗疮疡阳证外治的首选方剂, 故标准答案为 A。

116. **答案:** B 解析: 本题表述的症状亦为阳证, 主要以湿热蕴结为主。青黛膏功能收湿止痒, 清热解毒, 可用于皮肤焮肿痒痛, 故为外治首选方。而红油膏主祛腐生肌; 白玉膏主润肤生肌; 冲和膏主半阴半阳之证, 均非首选方剂。

117. **答案:** B 解析: 实记题。

118. **答案:** D 解析: 实记题。

119. **答案:** C 解析: 传染性软疣为半球形丘疹, 米粒到黄豆大小, 具有传染性, 因病变浅表, 故适用于针挑法治疗。而浸渍法适用于疮疡、湿疹; 挖除法适用于掌跖疣; 结扎法适用于丝状疣。

120. **答案:** A 解析: 寻常疣为隆起性赘生物, 好发于手背、手指和头面部, 故选用推疣法治疗。

121. **答案:** C 解析: 牛皮癣以皮肤局限性苔藓样变, 伴剧烈瘙痒为临床特征。

122. **答案:** D 解析: 瘾疹是一种皮肤出现红色或苍白风团, 时隐时现的瘙痒性、过敏性皮肤病。

123. **答案:** C 解析: 直肠指检前列腺肿胀饱满, 压痛明显为急性前列腺炎诊断要点。

124. **答案:** C 解析: 直肠指检前列腺肿胀饱满, 压痛明显为急性前列腺炎诊断要点。

125. **答案:** B 解析: 肠痈湿热证: ①证候为右下腹痛甚有压痛及反跳痛, 腹肌紧张, 口渴, 发热, 食欲不振, 便秘, 尿黄, 苔黄腻, 脉滑数; ②治法为通腑泻热, 解毒利湿透脓; ③方药为复方大柴胡汤加减。正确答案为 B

126. **答案:** A 解析: 肠痈瘀滞型: ①证候为转移性右下腹疼痛、恶心嗝气, 纳呆, 脘腹胀闷不适, 疼痛或有定处或窜痛, 发热轻, 舌质淡红, 苔薄白, 脉弦紧; ②治法为行气活血, 通腑泻热; ③方药为大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

127. **答案:** A 解析: 根据题干, 此证属湿热下注证。治宜清热利湿, 活血化瘀。方药为四妙勇安汤加味。

128. **答案:** C 解析: 根据题干, 此证属气虚湿阻证。治宜益气健脾, 祛湿通络。方药为参苓白术散加味。

129. **答案:** E 解析: 女子怀孕 6 周左右易见脉滑有力或滑数, 尺脉按之不绝, 因月经停止, 阴血下注以养胎, 冲任气血旺盛之故, 此为妊娠常脉。

130. **答案:** B 解析: 《产孕集》云: “尺脉转急, 如切绳转珠者, 欲产也。”

131. **答案:** C 解析: 需询问经初潮年龄, 月经周期、月经持续时间、经量多少、经色、经质稀或稠或有无血块、气味, 末次月经日期及伴随月经周期而出现的症状(如乳房胀痛、头痛、腹痛、腹泻、水肿、吐衄、发热等)。中老年妇女应了解是否绝经和绝经年龄以及绝经后有无阴道出血、骨质疏松症状。

132. **答案:** D 解析: 了解带下量多少, 带下颜色(如白色、淡黄、黄色、赤色或脓性等),

带下性质(稀薄、黏稠), 气味以及伴随症状。

133. **答案:** D 解析:

134. **答案:** B 解析: 开创妇科外治法先河的是《金匱要略》。

135. **答案:** C 解析: 1. 中药贴敷法适用于用于外阴血肿、溃疡、脓肿切开, 也可用于乳痈或回乳, 还应用于痛经、产后腹痛、妇产科术后腹痛、不孕症、癥瘕等疾病。

136. **答案:** B 解析: 1. 中药贴敷法适用于用于外阴血肿、溃疡、脓肿切开, 也可用于乳痈或回乳, 还应用于痛经、产后腹痛、妇产科术后腹痛、不孕症、癥瘕等疾病。

137. **答案:** A 解析: 1. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于经行头痛痰湿中阻证, 故其治疗方剂是半夏白术天麻汤。2. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于经行头痛肝火证, 故其治疗方剂是羚角钩藤汤。

138. **答案:** C 解析: 1. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于经行头痛痰湿中阻证, 故其治疗方剂是半夏白术天麻汤。2. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于经行头痛肝火证, 故其治疗方剂是羚角钩藤汤。

139. **答案:** A 解析: 1. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于痛经肾气亏损证, 故其治法为补肾益气, 养血止痛。2. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于痛经气滞血瘀证, 故其治法为理气行滞, 化瘀止痛。

140. **答案:** E 解析: 1. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于痛经肾气亏损证, 故其治法为补肾益气, 养血止痛。2. 根据该题主要症状的描述, 该患者属于痛经气滞血瘀证, 故其治法为理气行滞, 化瘀止痛。

141. **答案:** E 解析: 实记题

142. **答案:** A 解析: 脾肾两虚为带下病之内因, 故治疗宜调补脾肾, 治脾宜升宜燥, 治肾宜补宜涩。

143. **答案:** B 解析: 妊娠中晚期, 头晕目眩, 或伴面浮肢肿, 甚者昏眩欲厥, 称为“妊娠眩晕”, 亦称“子晕”。

144. **答案:** C 解析: 妊娠中晚期, 孕妇出现肢体面目肿胀者, 称为“妊娠肿胀”, 又称“子肿”。

145. **答案:** A 解析: 厌食中的脾失健运证的治法为调和脾胃、运脾开胃, 故选择 A。

146. **答案:** D **解析:** 顾名思义
147. **答案:** C **解析:** 慢惊风阴虚风动型的临床表现为精神疲惫, 形容憔悴, 面色萎黄或时有潮红, 虚烦低热, 手足心热, 易出汗, 大便干结, 肢体拘挛或强直, 抽搐时轻时重, 舌绛少津, 苔少或无苔, 脉细数。治法为育阴潜阳, 滋肾养肝。方药为大定风珠加减。
148. **答案:** D **解析:** 慢惊风脾虚肝亢型的临床表现为精神萎靡, 嗜睡露睛, 面色萎黄, 不欲饮食, 大便稀溏, 色带青绿, 时有肠鸣, 四肢不温, 抽搐无力, 时作时止, 舌淡苔白, 脉沉弱。治法为温中健脾, 缓肝理脾。方药为缓肝理脾汤加减。
149. **答案:** E **解析:** 实记题。
150. **答案:** D **解析:** 实记题。